

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 07 по 13 листопада 2025 року.

Озимий ріпак – сходи, 2 листочки. Озима пшениця – сходи, кущення.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 20 % обстежених площ (433 га).

У посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 41 % обстежених площ, капустяної попелицею в середній чисельності 4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 59 % обстежених площ. Білою плямистістю уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 41 % обстежених площ (200 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 4 на 30 % обстеженої площі 433 га. На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 141 га. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 80 га. На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 45 на 100 % обстеженої площі 1 га. На площі озимого ячменю (110 га) мишоподібних гризунів не виявлено.

Комірні шкідники. При обстеженні 0,022 тис. тонн пшениці, 0,037 тис. тонн кукурудзи та 0,029 тис. тонн соняшнику шкідників не виявлено.