

1. Залежно від кількості ймовірних хазяїнів:

- евриксенні (від грец. εὐρύω – широкий) – ті, що мають широке коло хазяїнів (іксодові кліщі, комарі);
- моноксенні (від грец. μόνος – один, єдиний) – ті, що паразитують на хазяїні певного виду (кривоголовка, неозброєний ціп'як – у кишківнику людини; головна воша – на тілі людини);
- стеноксенні (від грец. στενός – вузький і ξενία) – ті, що мають певний вид хазяїна, але можуть паразитувати й на інших (коростяний кліщ людини й коня); серед них є звичайні – такі, що трапляються у певного хазяїна (собача блоха – у собаки, людська блоха – в людини), і випадкові – ті, що випадково потрапляють до невласного їм хазяїна; наприклад, при проковтненні блохи, зараженої пистицеркоїдами, людина може стати хазяїном собачого ціп'яка – паразита собак і котів;

2. Залежно від терміну паразитування:

– тимчасові – такі, що живуть поза організмом хазяїна і нападають на нього лише для живлення кров'ю (кліщі, блохи, комарі, москїти) тривалістю від півхвилини до кількох діб;

– постійні – живуть в організмі хазяїна чи на його покриттях на всіх стадіях розвитку. Постійні паразити на довгий час, іноді на все життя поселяються на господаря, так що останній є постійним носієм паразита. Стаціонарний паразитизм розбивається здебільшого на періодичний, коли паразит проводить частину свого життя поза зв'язку з господарем, і на постійний, тобто триває протягом усього життя паразита.

Питання до відеоролику:

1.В якому середовищі розмножується нематоморф (волосатик)?

2.Хазяїном якого паразитичного організму є тропічні мурахи?

3.Хто є переносником малярійного плазмодія між хазяями?

4.Який паразит може інфікувати щурів,які поїдають котячі фекалії?
