

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 19 по 25 липня 2024 року.

Кукурудза – цвітіння волоті та качана, молочна стиглість. Соняшник – цвітіння, формування кошиків. Соя – цвітіння. Картопля – в'янення бадилля. Сад – формування та ріст плодів.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими попелицями за середньої чисельності 12 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 31 % рослин на 84 % обстежених площ, злаковими блішками за середньої чисельності 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 13 % рослин на 86 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 35 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика за середньої чисельності 1 екз. на рослину в заселено 3 % рослин на 52 % обстежених площ (546 га).

В посівах сої гусеницями совки гамма за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 38 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 49 % обстежених площ, аскохітозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 27 % обстежених площ (264 га).

В посівах соняшнику буряковою попелицею за середньої чисельності 8 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 8 % обстежених площ, геліхризовою попелицею в середній чисельності 16 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 42 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 16 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1,2 екз. на кошик в середньому пошкоджено 2 % рослин на 12 % обстежених площ. Фомозом уражено 9 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 59 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстежених площ, септоріозом уражено 18 % рослин з розвитком хвороби 13 % на 23 % обстежених площ (658 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на кущ в середньому заселено 1 % кущів, личинками в середній чисельності 4 екз. на кущ заселено і пошкоджено 5 % кущів картоплі. Фітофторозом уражено 15 % рослин з розвитком хвороби 11 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 10 % рослин томатів з розвитком хвороби 7 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках в посадках середній капусти капустяною попелицею в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 55 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 4 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину пошкоджено 45 % рослин.

В плодівих садах паршею яблуні уражено 8 % листків з розвитком хвороби 5 % та 3 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 30 % дерев на 100 % площ, плодовою гниллю уражено 10 % плодів падалиці під 70 % дерев на 100 % площ (4 га).