

Тема: Особливості розведення хутрових звірів.

План:

- 1. Статева зрілість і господарське використання хутрових звірів.**
- 2. Підготовка гону. Строки гону.**

1. Статева зрілість і господарське використання хутрових звірів.

Норка - порівняно невеликий, сильний звір, який зберіг дикі інстинкти, що характеризуються сезонністю життєвих функцій. Статева зрілість настає в 9-10 міс.

Вагітність має прихований період і триває від 34-х до 80 днів, а справжня вагітність - 30 днів. Щеніння проходить в кінці квітня і на початку травня. Середня плодючість норки - 5-6 щенят у приплоді. У виробництві норки використовуються не більше 5 років.

Лисиця належить до ряду хижаків, родини собачих, роду лисиць. Лисиця - великий хутровий звір з пишним довговолосим хутром. Тривалість життя 10-12 років, статеву зрілість настає у віці 9-11 міс, строк вагітності від 48 до 58 днів (в середньому 52 дні), плодючість 5-6 щенят. Відсаджують молодняк в 45-50 днів.

Лисиці нормально розмножуються до 6-7 років.

Песець належить до ряду хижих, родини собачих, роду песців. Тривалість життя складає 8-10 років, статеву зрілість настає в 9-10 міс. Песці моноестричні тварини. Гін звичайно починається з середини лютого і закінчується в квітні, строк вагітності від 49 до 57 днів (53 дні). Песці непогано розмножуються протягом 4-6 років. Плодючість 10-12 щенят. Відсаджують молодняк в 45-50 днів.

Нутрія належать до ряду гризунів, життя їхнє тісно пов'язане з водою. Живуть нутрії 6-8 років. Вагітність 132 дні. Після 4-річного віку плодючість знижується.

Перший раз рекомендується парувати нутрій у віці 7-8 міс. живою масою 4-4,5 кг. Плодючість 5-7 щенят, масою 200-300г. Відсаджують молодняк в 40-50 днів.

Шиншила. Належить до ряду гризунів, родини шиншилових. Розрізняють два види шиншил - велику, або короткохвосту і малу, або довгохвосту чи берегову.

Тривалість життя 15-18 років, максимальна продуктивність спостерігається в 2-5-річному віці.

Для шиншили не характерна сезонність розмноження, але все-таки основний період парування припадає на грудень - січень і березень - квітень. Від самки можна отримати 2-3 приплоди в рік. Вагітність триває у малої шиншили 106-114 днів, у великої - 117-118 днів. Плодючість 1-2 щеняти, рідше 3-4, вага 45-50г. Відсаджують молодняк в 30-35 днів.

За добрих умов годівлі статева зрілість у самки настає в 2-3 міс, у самців - у 4-5 міс. Парувати їх слід не раніше 6-7 місяців.

2. Підготовка гону. Строки гону.

При догляді за м'ясоїдними звірами враховують сезонність їх розмноження. Виробничий рік на звірофермах розділяють на такі періоди:

- підготовка до гону (період розвитку статевих органів і підготовка організму до розмноження);
- гін (коли закінчується розвиток статевих органів і проходить парування);
- вагітність самок;
- щеніння і лактація;
- вирощування молодняку, відсадженого від самок;
- "спокій" дорослих звірів (після завершення гону у самців і лактації у самок до початку підготовки до гону).

Підготовка до гону полягає в забезпеченні організму звірів повноцінними поживними раціонами і підтримання живої маси на середньому рівні. На практиці контроль за вгодованістю здійснюється візуально, а також із вирахуванням індексу вгодованості - маса тіла, довжина тіла, см. Самки норок до середини лютого повинні мати заводські кондиції при індексі вгодованості на менше 23 і не більше 27.

У самок лисиць при індексі в середині січня 80-99 (вгодованість вище середньої) вихід щенят буває більш високим, ніж у самок середньої і нижче середньої вгодованості.

Песці з індексом на 1 березня більше 106 (ожиріння) мають менший вихід щенят порівняно зі звірами середньої вгодованості. Кращий період для гону у норок - березень:

у лисиць - кінець січня - початок березня, у песців - у другій декаді лютого до кінця березня, інколи в квітні. Пік гону відбувається у березні.

У звірівництві прийнята полігамія: 1: 5 (хижаки), у нутрії - 1: 8-10.