

انشطة في درس التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض قاعدة في محلول مائي

التحلل البرتوني الذاتي للماء


$$\sigma_{H_2O} = 5,5 \cdot 10^{-6} S/m$$

- نعتبر حجما $V=1L$ من الماء الخالص عند $25^\circ C$ ، موصليته غير منعقدة بقياسها نجد
- 1- الماء H_2O قاعدة للمزدوجة $H_3O^+_{(aq)}/H_2O_{(l)}$ ، و حمض للمزدوجة $H_2O_{(l)}/OH^-_{(aq)}$. معادلة التفاعل بين الحمض H_2O و القاعدة H_2O ، فسر لماذا موصلية الماء الخالص غير منعقدة.
 - 2- انشئ الجدول الوصفي للتحول السابق ،
 - 3- احسب تركيز الايونات $[H_3O^+]$ و استنتج قيمة pH المحلول علما ان $\lambda(H_3O^+) = 54,9 \text{ ms/m}^2 \cdot \text{mol}$ و $\lambda(OH^-) = 19,8 \text{ ms/m}^2 \cdot \text{mol}$
 - 4- احسب نسبة التقدم النهائي T ، استنتج ؟
 - 5- نسمي ثابتة التوازن المقرون بمعادلة التحول بين جزيئا الماء بالجداء الأيوني للماء، اكتب تعبيره و احسب قيمته
 - 6- يمكن كذلك تعريف مقدار آخر لمعادلة التحول بين جزيئا الماء هو pK_e احسب قيمة pK_e علما ان $pK_e = -\log K_e$

المحلول الحمضي المحايد و القاعدي

- نعرف الطابع الحمضي او المحايد او القاعدي لمحلول بمقارنة pH هذا المحلول مع pH الماء الخالص (المقطر) عند نفس درجة الحرارة
- 1- بالنسبة لمحلول حمضي قارن بين $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ثم استنتج تعبير مجال تغير pH المحلول الحمضي بدلالة pK_e
 - 2- بالنسبة لمحلول محايد قارن بين $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ثم استنتج تعبير مجال تغير pH المحلول المحايد بدلالة pK_e
 - 3- بالنسبة لمحلول قاعدي قارن بين $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ ثم استنتج تعبير مجال تغير pH المحلول القاعدي بدلالة pK_e
 - 4- عند $25^\circ C$ فان $pK_e = 14$ حدد مجال تغير المحلول الحمضي المحايد و القاعدي

مخطط هيمنة النوعين المترافقين لمزدوجة قاعدة/حمض



- نعتبر مزدوجة قاعدة / حمض ثابتتها الحمضية هي K_A
- 1- اكتب تعبير ثابتة الحمضية K_A للمزدوجة نرسم لها اختصارا $AH_{(aq)}/A^-_{(aq)}$
 - 2- بين ان النسبة $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{(pH - pK_A)}$ يكتب على الشكل
 - 3- مستعينا بالعلاقة السابقة حدد في حالة :
 - 3-1- $pH < pK_A$ اي من النوعين A ام AH هو المهيمن في المحلول
 - 3-1- $pH = pK_A$ اي من النوعين A ام AH هو المهيمن في المحلول
 - 3-1- $pH > pK_A$ اي من النوعين A ام AH هو المهيمن في المحلول
 - 4- اتمم ملئ مخطط الشكل جانبه حسب مجال و نسبة هيمنة كل نوع من الانواع الحمضية القاعدية للمزدوجة $AH_{(aq)}/A^-_{(aq)}$

سلوك الاحماض و القواعد في محلول مائي

نعتبر محاليل مائية لـ حمض الايثانويك ، حمض الميثانويك ، الامونياك و الميثيل أمين تركيزها $C=10^{-2} \text{ mol/L}$ ، يمكن قياس pH محاليل حمضية مختلفة أو محاليل قاعدية مختلفة لها التركيز نفسه من مقارنة سلوكات هذه الاحماض فيما بينها أو هذه القواعد فيما بينها .

الحمض	CH_3COOH	$HCOOH$
pH	3,4	2,9
K_A	$1,8 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-4}$
القاعدة	NH_3	CH_3NH_2
pH	10,6	11,4
K_A	$6,3 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-11}$

- أحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل كل حمض مع الماء ثم لتفاعل كل قاعدة مع الماء .
- 1- تزداد قابلية فقدان حمض لبروتون أي تفككه في الماء كلما إزدادت نسبة التقدم النهائي لتفاعله مع الماء . ما تأثير ثابتة الحمضية على تفككه في الماء ؟ رتب هذه الأحماض حسب تزايد تفككها في الماء .
 - 2- تزداد قابلية إكتساب قاعدة لبروتون كلما زادت نسبة التقدم النهائي لتفاعلها مع الماء . ما تأثير ثابتة الحمضية على قابلية إكتساب قاعدة لبروتون.

الكواشف الملونة

نضيف إلى محاليل مائية ذات pH مختلف قطرات من أزرق البروموتيمول، ثم نلاحظ.

المحلول	pH	لون المحلول
	4.0	
	4.5	
	5.0	
	5.5	
	6.0	
	6.5	
	7.0	
	7.5	
	8.0	
	9.0	

1. ما الخاصية المميزة للكواشف الملونة التي تم إبرازها في هذه التجربة.
2. الشكل الحمضي لـ BBT لونه أصفر، والشكل القاعدي لونها أزرق، عين مجال هيمنة كل شكل.
3. عين منطقة انعطاف الكاشف BBT.


معايرة حمض بقاعدة

قبل إستعماله جهاز pH- يتم تعبيره بمحلول عيار ذي $pH=4$.
 نأخذ حجما $V_A=20mL$ من حمض الإيثانويك و نصبه في كأس. نضع مجس pH-متر في الكأس السابقة و نضيف الماء المقطر إلى أن ينغمر في الكأس .
 نملأ السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم و نضبط مستوى المحلول عند تدريجة الصفر . ندون قيم pH الموافقة للحجوم المضافة V_B من محلول
 لهيدروكسيد الصوديوم (Na^++OH^-) تركيزه $C_B=2.10^{-2}mol/L$.


12	11	10	9	8	6	4	2	1	0	$V_B(mL)$
6.2	5.6	5.4	5.2	5	4.7	4.4	4.1	3.8	3.3	pH
20	16	15	14	13.5	13	12.6	12.4	12.2		$V_B(mL)$
11.6	11.3	11.2	11	10.8	10.6	10.1	8.3	6.5		pH

- 1- أكتب معادلة التفاعل ما نوع هذا التفاعل ؟
- 2- خط المنحنى $(pH=f(V_B))$ و حله في أي جزء من المنحنى توجد نقطة التكافؤ E ؟
- 3- بواسطة جدول أحسب قيم المشتقة dpH/dV_B و مثلها على نفس المبيان. ما الخاصية التي يتميز بها منحنى dpH/dV_B عند حجم التكافؤ V_E .
- 4- حدد احداثيات E نقطة التكافؤ و احسب التركيز C_A

www.AdrarPhysic.Com



$$\text{خط المنحنى } (f(V_B) = \frac{dpH}{dV_B})$$



www.AdrarPhysic.Com