2 éme Bac (PC)	قوانين نيوتن	Www.AdrarPhysic.Com

التمرين 1

إحداثيات متجهة الموضع $\overrightarrow{OG}$ ، لمركز القصور لجسم صلب خلال حركته ، في معلم متعامد وممنظم $R(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ هي :

$x(t)=2t$; $y(t)=t^2-1$; $z(t)=2$ ، بحيث $t\geq 0$ وبوحدة s .

1) أعط تعبير متجهة الموضع $\overrightarrow{OG}$ في المعلم $R(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

2) لتكن $\vec{V}_G$ متجهة السرعة لمركز قصور المتحرك.

1.2) أوجد إحداثيات متجهة السرعة $\vec{V}_G$ في نفس المعلم .

2.2) أوجد تعبير منظم متجهة السرعة . هل الحركة منتظمة ؟

3.2) حدد قيمة سرعة مركز قصور الجسم عند اللحظة $t=2s$.

3) لتكن $\vec{a}_G$ متجهة التسارع لمركز قصور المتحرك.


1.3) حدد إحداثيات متجهة التسارع $\vec{a}_G$.

2.3) أوجد منظم متجهة التسارع .

3.3) حدد المجال الزمني الذي تكون فيه الحركة متسارعة .

التمرين 2

نطبق قوة أفقية شدتها $F=0,5N$ بواسطة خيط على حامل ذاتي كتلته m يوجد فوق منضدة هوائية أفقية .ندرس حركة الحامل في معلم $R(O,\vec{i})$ ، الذي نعتبره غاليليا ، أعطت دراسة حركة مركز قصور الحامل الذاتي المنحنى التالي الممثل لتغيرات سرعة مركز قصور الحامل الذاتي بدلالة الزمن :




1) ما طبيعة حركة الحامل الذاتي ؟ علل جوابك . استنتج قيمة التسارع .

2) أوجد المعادلتين الزمنيتين ($x(t);v(t)$) المميزة لحركة مركز قصور الحامل الذاتي علما أنه : $x(t=0)=x_0=-0,15m$.

3) بتطبيق قانون نيوتن الثاني ، عين كتلة الحامل الذاتي .

التمرين 3

تمثل الوثيقة أسفله بالسلم الحقيقي ، تسجيل مواضع نقطة M من جسم صلب في حركة مستقيمية ، حيث المدة الزمنية التي تفصل بين تسجيل نقطتين متتاليتين هي $\tau=50ms$. نختار M_0 أصلا لمعلم الفضاء $R(O,\vec{i})$ ولحظة مرور الجسم من الموضع M_1 أصلا للتواريخ



1) أحسب، V_1 و V_3 ، سرعة النقطة M في الموضعين M_1 و M_3 .

2) مثل باستعمال سلم مناسب متجهتي السرعتين V_1 و V_3 .

3) مثل في نفس التسجيل الفرق $\Delta\vec{V}=\vec{V}_3-\vec{V}_1$ في الموضع M_2


4) عين قيمة a_2 تسارع النقطة M في الموضع M_2 ومثلها بسلم مناسب.


5) أكتب المعادلة الزمنية لحركة النقطة M .

6) علل هل حركة النقطة M متباطئة أم متسارعة .

التمرين 3

نعتبر جسما صلبا (S) ذا كتلة $m = 200\,g$ في حركة إزاحة مستقيمية فوق سطح مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي الشكل(1) . يمثل الشكل(2) مخطط السرعة للجسم (S) . نهمل جميع الاحتكاكات .





1) حدد طبيعة حركة الجسم (S) .

2) أكتب المعادلة الزمنية $x(t)$ لحركة مركز القصور للجسم (S) علما أنه يوجد في النقطة O عند اللحظة $t = 0$.

3) علما أن الجسم (S) يصل إلى النقطة A بسرعة V_A حيث $OA = L = 6m$:

1.3) أوجد تعبير V_A بدلالة V_0 السرعة البدئية عند اللحظة $t = 0$ و والتسارع a و L . أحسب V_A .

2.3) عين t_A لحظة وصول الجسم (S) إلى الموضع A .

4) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

1.4) أوجد تعبير التسارع a لمركز قصور (S) بدلالة g و α . عين قيمة α .

2.4) استنتج شدة القوة $\vec{R}$ المطبقة من طرف السطح على (S) .

نعطي : $g = 10\,m.s^{-1}$.

التمرين 4

ندرس حركة جسم صلب S كتلته $m = 500\,g$ في معلم أرضي نعتبره غاليليا .

ينطلق الجسم من النقطة A بدون سرعة بدئية تحت تأثير قوة $\vec{F}$ ثابتة . تطبق القوة $\vec{F}$ طول المسار $AB = \ell = 1{,}5m$ فقط.

الجزء AC مستقيمي بينما الجزء CD دائري شعاعه r . ($r = 1m$)


نفترض أن الاحتكاكات مهملة .

1) أوجد تعبير التسارع a للحركة ثم استنتج تعبير السرعة V_B للجسم عند النقطة B بدلالة ℓ و m و F.

2) بين بدون حساب أن : $V_B = V_C$ ، بحيث V_C سرعة الجسم عند C .

3) نعتبر النقطة M بحيث $\theta = (\vec{OC}, \vec{OM})$ ، أوجد V_M تعبير سرعة الجسم عند النقطة M بدلالة ℓ و m و F و θ و g و r بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية .

4) بكتابتك لقانون نيوتن الثاني ، وإسقاطه على معلم فريني ، بين أن تعبير شدة القوة المطبقة على الجسم من طرف السطح الدائري عند النقطة M هو : $R = m\left(g\cos\theta + \frac{V_M^2}{r}\right)$.



5) انطلاقا من تعبير شدة القوة R ومن تعبير السرعة V_M ، أوجد القيمة الدنوية F_0 للقوة $\vec{F}$ لكي يصل الجسم للنقطة D . أحسب F_0 .

(ملحوظة : لكي لا يغادر الجسم السكة ،يجب أن تبقى $R > 0$)


نعطي : $g = 10\,m.s^{-1}$.

Www.AdrarPhysic.Com

2 éme Bac (PC)	قوانين نيوتن	Www.AdrarPhysic.Com

التمرين 1

يمثل الشكل أسفله ، التسجيل بالسلم الحقيقي ، للنقط المحتلة من طرف مركز قصور حامل ذاتي ، كتلته $m = 683\,g$ ، خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية $\tau = 40\,ms$ ، حيث الحامل الذاتي مرتبط بطرف خيط غير قابل للامتداد طرفه الآخر مثبت في نقطة O .



1) حدد طبيعة حركة مركز قصور الحامل الذاتي .

2) مثل على التسجيل متجهة السرعة $\vec{V}_3$ ومتجهة السرعة $\vec{V}_5$ لمركز القصور عند النقطتين G_3 و G_5 .

3) أنشئ في النقطة G_4 المتجهة $\vec{\Delta V} = \vec{V}_5 - \vec{V}_3$.


4) حدد مميزات متجهة التسارع $\vec{a}_4$ عند الموضع G_4 .

5) بتطبيق قانون نيوتن الثاني ، حدد T شدة القوة المطبقة من طرف الخيط على الحامل الذاتي .

التمرين 2

يتحرك جسم صلب (S) كتلته $m = 1Kg$ على سطح أفقي بدون احتكاك .

1) مكنت الدراسة التجريبية لحركة مركز قصوره G من الحصول على مخطط السرعة (الشكل1)



1.1) ما طبيعة حركة G مركز قصور الجسم (S) ؟ علل جوابك .


2.1) أوجد المعادلة الزمنية $x = f(t)$ علما أن أفصول المتحرك عند أصل التواريخ هو $12,5m$.

2) علما أنه خلال هذه الحركة، يخضع الجسم (S) لقوة $\vec{F}_1$ ثابتة اتجاهها موازٍ للسطح الأفقي (الشكل2) .

1.2) استرجع قوانين نيوتن الثلاثة

2.2) بتطبيق قانون نيوتن الثاني، أوجد تعبير F_1 وأحسب قيمتها .

3) بعد ذلك، يرتقي الجسم (S) مستوى مائلا بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي تحت تأثير قوة شدتها $F_2 = 10\,N$ اتجاهها موازٍ للمستوى المائل .



1.3) أوجد تعبير a_2 تسارع مركز قصور الجسم (S) . ما طبيعة الحركة ؟

2.3. عين شدة القوة $\vec{R}_2$ التي يطبقها سطح التماس على الجسم (S) .


نعطي : $g = 10\,N.Kg^{-1}$.

التمرين 3

نعتبر سكة $ABCD$ تتكون من ثلاثة أجزاء توجد في نفس المستوى الأفقي:

- ✔ جزء مستقيمي AB طوله $AB = 1{,}0m$ ، مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للخط الأفقي .
- ✔ جزء مستقيمي وأفقي BC طوله $BC = 1{,}0m$
- ✔ جزء CD دائري مركزه O وشعاعه $r = 1{,}0\,m$.

1) نطلق جسما نقطيا (S) كتلته $m = 1Kg$ بسرعة بدئية $V_A = 2{,}0\,m.s^{-1}$ انطلاقا من النقطة A ، فينزلق فوق السكة $ABCD$ ، ليصل إلى النقطة B بسرعة $V_B = 3{,}0\,m.s^{-1}$



1.1) أحسب تغير الطاقة الحركية للجسم (S) بين الموضعين A و B .

2.1) أحسب شغل وزن (S) بين A و B . نعطي : $g = 10m.s^{-2}$.

3.1) استنتج شغل القوة $\vec{R}$ المقرونة بتأثير الجزء (AB) على الجسم (S) خلال انتقاله من A نحو B .

4.1) أحسب قيمة الزاوية φ التي يكونها اتجاه القوة $\vec{R}$ مع المنظمي على الجزء (AB) .

5.1) أحسب سرعة الجسم (S) عند وصوله إلى النقطة C ، علما أن هذا الجزء يطبق على (S) قوة احتكاك $\vec{f}'$ ثابتة ، موازية للجزء BC وشدتها $f' = 4N$.

2) نطلق، الآن، الجسم (S) من النقطة C بدون سرعة بدئية، فينزلق بدون احتكاك على الجزء CD .

1.2) بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية ، أوجد سرعة الجسم (S) عند النقطة M بدلالة g و r و θ بحيث $\theta = (\vec{OD}, \vec{OM})$.

2.2) بين أن تعبير شدة القوة $\vec{R}_M$ التي يطبقها الجزء (CD) على (S) عند النقطة M يكتب كما يلي :

$$R_M = mg(3\cos\theta - 2)$$

3.2) بالنسبة لأي قيمة θ_0 للزاوية θ يغادر (S) الجزء (CD)

3.3) أحسب سرعة الجسم (S) في هذا الموضع .

Www.AdrarPhysic.Com