

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 28 квітня – 04 травня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – початок трубкування. Озимий ріпак – початок цвітіння. Горох - третій листок. Сад – бутонізація, цвітіння.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками за середньої чисельності 1,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 58 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 5 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 2 % рослин на 28 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 45 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 7 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 3 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 5 екз. на 100 п.с. на 33-35 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 6 екз. на 100 п.с. заселено 33 % обстежених площ. Борошнистою росю уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 26 % обстежених площ, бурю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 30 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 52 % обстежених площ (1733 га).

В посівах озимого ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 73 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимого ячменю спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 7 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 4 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 8 екз. на 100 п.с. на 15 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 5 екз. на 100 п.с. заселено 34 % обстежених площ. Септоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 19 % обстежених площ, бурю іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 19 % обстежених площ (495 га).

В посівах ячменю хлібною п'явицею за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 57 % обстежених площ, середня чисельність піщаного мідляка 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 43 % обстежених площ. Ринхоспоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 57 % обстежених площ (105 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 47 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 29 % обстежених площ, ріпаківим листоїдом за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 16 % обстежених площ, ріпаківим насінневым прихованохоботником в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та

пошкоджено 12 % рослин на 19 % обстежених площ; оленкою волохатою в середній чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 8 % рослин на 21 % обстежених площ, ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 20 % обстежених площ. Альтернатіозом уражено 12 % рослин з розвитком хвороби 9 % на 23 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 15 % обстежених площ (521 га).

В плодівих садах яблуневим квіткоїдом пошкоджено 2 % бруньок на 30 % дерев за щільності шкідника 12 екз. на дерево на 100 % площ, розановою листокруткою за середньої чисельності гусениць 1 екз. на п.м.г. в середньому пошкоджено 1 % листків на 20 % дерев на 20 % площ, яблуневою попелицею в середній чисельності 1 екз. на лист пошкоджено 1 % листків в середньому на 10 % дерев на 20 % площ (5 га).