

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 28 березня по 03 квітня 2025 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – кущення. Озимий ріпак – 6-8 листків.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 14 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці (туруна) в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 14% обстеженої площі, борошнистою росою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 19 % обстежених площ, бурюю іржею уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 20 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 47 % обстежених площ (1395 га).

В посівах озимого ячменю бурюю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 26 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 23 % обстежених площ (302 га).

В посівах озимого ріпаку ріпаківим листоїдом в середній чисельності 1 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин на 25 % обстежених площ, альтернarioзом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 53 % обстежених площ (199 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,4, нір на колонію – 3 на 41 % від обстежених площ 1395 га. На обстежених площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 4 на 39 % від обстеженої площі 302 га. На обстежених площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 4 на 8 % від обстеженої площі 191 га. На неорних площах (5 га) мишоподібних гризунів не виявлено.