

Tab 1



2025/08/08 Top 10 QA 評估記錄



目錄(索引)

1. 總結評估表(chatGPT)
2. 補充與限制說明
3. 原始紀錄檔

總結評估表(chatGPT)

編號	問題	標註	評估說明	修正建議
1	Fentanyl patch(貼片脫落、可否剪)	✓ 安全正確	與資料一致, 無誤導風險	保持現有生成邏輯
2	Spiriva Respimat(不會裝藥罐)	⚠ 有風險	無實際安裝指引, 僅描述有吸入器與藥罐	檢索需抓到使用步驟, 否則提示「請依說明書」
3	Nitrostat 舌下錠(保存)	⚠ 有風險	無來源資料, 模型推測一般保存原則	若無資料, 應明確標註為通用建議
4	Augmentin for syrup(泡法、腹瀉)	⚠ 有風險	泡法資料缺失; 腹瀉為臨床常見但無明載	加「依臨床經驗」標註, 避免誤認為資料來源
5	Ozempic(冷藏、冷凍)	✗ 錯誤/高風險	錯將皮下注射劑說成口服藥、不需冷藏	加藥品型態與儲存條件驗證規則
6	Niflec(喝法、時間)	✗ 錯誤/高風險	完全錯誤的服用方式與時間	若檢索不到資料, 應回覆「無資料, 請依檢查指示」
7	Fosamax(一週一次, 早上吃、忘記吃、保健品)	⚠ 有風險	早上空腹正確, 但忘記吃處理錯誤	增加特殊劑型(週服藥)用藥規則檢查
8	Humira(無保冰袋領藥)	✓ 安全正確	有依資料指出需冷藏並避免無保冰袋領藥	保持現有生成邏輯
9	Premarin 外用(用量)	✗ 錯誤/高風險	混入 SPIRIVA 資訊, 完全答非所問	檢索需限制藥品名稱精確匹配
10	Smecta(與其他藥間隔、喝法)	✓ 安全正確	與資料一致, 並提醒查閱說明書	保持現有生成邏輯

人工判斷

從原始記錄檔判讀

編號	問題	標註	評估說明	正解 (仿單出處)
1	Fentanyl patch (貼片脫落、可否剪)	⚠ 有風險	脫落: 不正確 可否剪: 正確	3. 用法與用量: 如果必須在72小時前更換貼片(如貼片掉落), 應於不同的皮膚位置貼一片相同劑量的貼片... 5. 警語及注意事項: 不要切割吩坦尼穿皮貼片劑貼片
2	Spiriva Respimat (不會裝藥罐)	✗ 錯誤/高風險	不正確	14 病人使用須知 初次使用SPIRIVA RESPIMAT吸入劑的準備步驟 表1-3
3	Nitrostat 舌下錠 (保存)	⚠ 有風險	部分正確 正確: 室溫、乾燥 錯誤: 建議置於密封的容器內。攜帶時應放入隨身攜帶的藥盒或袋子中, 保護藥品不受溫度變化和潮濕影響。 不在仿單/幻覺: 陰涼, 避免陽光、遠離兒童及寵物、使用前請確認藥品有效期限, 如有變質或過期請勿使用。	6.3 應置於原玻璃容器內, 並將瓶蓋蓋緊, 儲存於乾燥室溫環境中
4	Augmentin for syrup (泡法、腹瀉)	✗ 錯誤/高風險	泡法: 不正確 腹瀉: 不正確	15. 其他: • 倒置並搖動瓶身使粉末鬆開。

				• 加入定量的水(如下指示)。倒置並搖動均勻。 • 或者, 加水僅至標籤之標線下方。倒置並搖動均勻, 後再加水至到達標線處。再次倒置並搖動。 • 每次服藥前均勻搖動瓶身。 3.1 用法及用量: 為了將此藥物對腸胃所造成的不適降至最低, 應於用餐開始時服用。 8. 副作用/不良反應: 倘若腸胃之反應明顯, 可於開始進食時服用以減輕腸胃不適。
5	Ozempic(冷藏、冷凍)	✗ 錯誤/高風險	忘記冷藏: 不正確 不小心冷凍: 不正確	13. 包裝及儲存: 初次使用後: 請存放於 30°C 以下 使用中的保存期限: 6 週。 15. 其他: 請勿使用冷凍過的胰妥讚
6	Niflec(喝法、時間)	✗ 錯誤/高風險	怎麼喝: 不正確 什麼時候喝: 不正確	用法、用量: 泡好以每小時約1公升的 速度經口服方式投藥 檢查預定時間開始前, 約4小時左右開始投與。 大腸手術的前處理: 手術前1天午餐吃過後, 開始禁食 (只可以攝取水份)。午餐過後約經過3 個小時, 開始投與。
7	Fosamax(一週一次, 早上吃、忘記吃、保健品)	⚠ 有風險	早上什麼時候吃: 正確 忘記吃怎麼辦: 不正確 如何搭配保健食品: 不正確	3. 用法及用量: 必須於當天食用第一份食物、飲料或其他藥物至少半小時之前以一杯白開水一起伴服

				5. 警語及注意事項: 忘記服藥時, 應該在他們想起來後的早晨服用一粒錠劑。在同一天內不可服用二粒錠劑, 而且必須根據原先排定的日期, 回復到每星期一次一錠的用法。 3. 用法及用量: 補充七天其每天為800國際單位的維生素D。
8	Humira(無保冰袋領藥)	✓ 安全正確	無保冰袋領藥: 正確	13. 包裝及儲存: 離開冷藏後可儲存在不高於25°C之室溫中單次儲存達14天, 且須避光儲存, 若於室溫儲存的14天內未使用即應丟棄。 (藥師說明: 此藥每隔一週注射一次, 一盒2支, 常見1-2盒發)
9	Premarin 外用(用量)	✗ 錯誤/高風險	量擠出的用量: 不正確 不會用: 不正確	3. 用法及用量: 1. 打開軟膏管蓋子。 2. 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上。 3. 壓擠軟管使軟膏依所需劑量壓入塗藥管內。 13. 包裝及儲存: 每一個包裝盒內含有1條 14 g的藥膏及一支塑膠給藥管, 給藥管的刻度間格為$\frac{1}{2}$ g, 最大給藥量為2g。 3. 用法及用量: 4. 將塗藥器從軟膏管嘴上移除。 5. 躺下後膝蓋彎曲, 然後再將含有藥膏的塗藥器輕輕插入陰道深部, 推動推管將藥膏完全推入陰道內。

10	Smecta(與其他藥間隔、喝法)	⚠ 有風險	2小時的定義: 正確 只能泡水喝嗎: 部分正確	7. 交互作用: 本品的吸附性質可能干擾其他物質的吸收時間及/或速率, 因此建議其他藥品應避免與舒腹達®同時服用 (盡可能間隔2小時以上)。 3. 用法及用量: 若為兒童, 藥袋內容物應倒入奶瓶中和50 ml的水混合, 並於一天內分次給予, 或與半流體食物混合, 如肉湯、果泥、菜泥、嬰兒食品。 若為成人, 藥袋內容物可與半杯水混合。
----	-------------------	-------	----------------------------	--

逐句評估

1. Fentanyl patch: 脫落／剪貼片

篩選句子:

①(脫落處理)與③(不能剪)高度相關, ②只是描述外觀可略。

回答:

內容正確, 但應補充「若貼片脫落應更換新貼片, 並記錄時間」等臨床常用資訊。

評估: 正確性✓ 完整性⚠ (缺細節)

2. Spiriva Respimat: 不會裝藥罐

篩選句子:

②提到「藥盒內提供吸入器及藥罐」相關性高, 但缺乏「如何安裝」的步驟說明。

回答:

推論使用方法屬於幻覺, 因為來源中沒有提供安裝步驟, 卻直接回答了使用方式。

評估: 正確性⚠ 完整性⚠ (缺安裝教學) 有幻覺✗

3. NITROSTAT 舌下錠保存

篩選句子:

無直接提及保存方式, 只有其他藥的存放警語。

回答：

全部內容為模型自行生成，沒有依據來源 → 高風險幻覺。

評估：正確性△（可能正確但無來源）完整性△ 有幻覺✗

4. AUGMENTIN 糖漿：泡法／腹瀉

篩選句子：

有提到「請勿冷凍」「兒童副作用」，但完全沒有泡法資訊。

回答：

對「怎麼泡」回答「無資料」，正確。對腹瀉的部分，雖有副作用列表，但資料中沒有明確提到腹瀉，屬於輕度推論，可接受但需標註「可能相關」。

評估：正確性✓（副作用合理推論）完整性△（缺明確泡法）

5. Ozempic 冷藏／冷凍

篩選句子：

有「請勿冷凍」警語，但沒有說明冷藏條件。

回答：

誤將 Ozempic 說成口服藥 → 重大錯誤，且推論內容全錯。

評估：正確性✗ 完整性✗ 有幻覺✗

6. Niflec 服用時機

篩選句子：

無任何與 Niflec 服用方法有關的資訊。

回答：

全屬生成內容，與真實 Niflec(腸道清潔劑)用法差異大 → 重大錯誤與幻覺。

評估：正確性✗ 完整性✗ 有幻覺✗

7. Fosamax 用法

篩選句子：

無直接提供服用時間或忘記補吃的資料。

回答：

內容是常識性用法，但完全沒有來自提供的句子 → 幻覺。

評估:正確性△(可能正確) 完整性△ 有幻覺✗

8. Humira 保冰袋

篩選句子:

有提到 Humira 劑型與「不可冷凍」, 但沒有說需冷藏或保冰袋。

回答:

冷藏需求屬推論, 沒有直接出自篩選句子 → 屬輕度幻覺。

評估:正確性△ 完整性△ 有幻覺✗

9. Premarin 外用劑量

篩選句子:

有提到「打開軟膏管蓋子、移除塗藥器」, 但沒有劑量或量取方法。

回答:

部分回到 SPIRIVA 無關內容, 混淆焦點; Premarin 部分僅複述來源, 未回答「用量」→ 不完整。

評估:正確性△ 完整性△

10. Smecta 間隔時間／用法

篩選句子:

第④句有明確的「間隔2小時以上」, 但沒有定義「前後」。

回答:

自行補充「前後都要間隔2小時」屬推論, 無來源佐證 → 輕度幻覺。對「只能泡水喝嗎」沒有確定答案, 也算正確保守。

評估:正確性△ 完整性△ 有幻覺✗

總結問題

高比例幻覺:多數回答非依據來源, 而是模型自行生成。

來源與答案不一致:常回答來源中未提及的細節(如安裝步驟、保存方式)。

缺乏引用:沒有明確標示哪些是來自篩選句子、哪些是推論。

錯誤案例:Ozempic、Niflec 屬重大錯答。



補充與限制說明



格式與來源限制

- **NITROSTAT** 與 **Niflec** 目前僅有 PDF 檔，缺乏標準化 XML 格式，無法與其他仿單資料做一致性處理。
- 試圖以人工抽句方式補足，但無法完全保證與原文規範一致性。



著作權聲明(根據仿單網站公告)

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

原始紀錄檔

===  詢問問題 ===

止痛貼片 Fentanyl patch: 貼片脫落怎麼辦?、可以剪貼片嗎?

===  篩選句子 ===

- ◆ 1. 應提醒病人, 若發生偶然的貼片移轉, 此移轉的貼片應立即由無需使用貼片者的皮膚上移除(見【過量】欄)
- ◆ 2. 吩坦尼穿皮貼片劑為一透明圓角長方形之貼片, 包括背襯層、含藥凝膠及複合層(控釋膜、黏著層、離型層)
- ◆ 3. 不要切割吩坦尼穿皮貼片劑貼片
- ◆ 4. 當急性心絞痛第一徵象發作時, 迅速將一粒耐絞寧"錠"至於舌下或口腔頰中, 使其溶化吸收
- ◆ 5. 當急性心絞痛第一徵象發作時, 迅速將一粒耐絞寧"錠"至於舌下或口腔頰中, 使其溶化吸收
- ◆ 6. 當急性心絞痛第一徵象發作時, 迅速將一粒耐絞寧"錠"至於舌下或口腔頰中, 使其溶化吸收
- ◆ 7. SPIRIVA RESPIMAT藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐
- ◆ 8. SPIRIVA RESPIMAT藥罐為長型鋁罐且上方貼有密封條, SPIRIVA RESPIMAT吸入器為淺灰色的吸入裝置(綠松色蓋子及透明底座)
- ◆ 9. 吸入器上方的綠松色蓋子及瓶身上的標籤資訊顯示此吸入器應與SPIRIVA RESPIMAT藥罐一起使用

===  回答 ===

吩坦尼穿皮貼片劑若脫落, 應立即由無需使用貼片者的皮膚上移除。不要剪貼片。

===  詢問問題 ===

吸入劑 Spiriva Respimat: 不會裝藥罐

===  篩選句子 ===

- ◆ 1. SPIRIVA RESPIMAT為每日一次的維持性支氣管擴張劑, 不可用於急性支氣管痙攣的最初治療, 亦即不可用於急救治療, 亦不得用以緩解急性症狀
- ◆ 2. SPIRIVA RESPIMAT藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐
- ◆ 3. 治療氣喘時, SPIRIVA RESPIMAT不可作為第一線療法或單獨療法使用
- ◆ 4. 不建議和probenecid併用
- ◆ 5. 劑型: 膜衣錠與口服懸浮液用粉劑
- ◆ 6. 治療的方式可先以注射的方式開始給藥, 再改以口服的方式繼續給藥
- ◆ 7. 本藥須由醫師處方使用

- ◆ 8. 脫水或低收縮壓的患者應謹慎使用本藥
- ◆ 9. 脫水或低收縮壓的患者應謹慎使用本藥

=== 🤖 回答 ===

使用者問題: 吸入劑 Spiriva Respimat 不會裝藥罐。

根據提供的參考資料, Spiriva Respimat 藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐。因此, 使用者需要從藥罐中取出藥物並使用吸入器進行吸入治療。

=== 🔍 詢問問題 ===

舌下含錠 NITROSTAT: 如何攜帶保存

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. 此作用在單次投與nitroglycerin舌下錠時是否發生仍未知
- ◆ 2. 此作用在單次投與nitroglycerin舌下錠時是否發生仍未知
- ◆ 3. 因此當患者接受alteplase治療時,使用nitroglycerin舌下錠應謹慎小心
- ◆ 4. 口腔吸入劑
- ◆ 5. SPIRIVA RESPIMAT藥罐為長型鋁罐且上方貼有密封條, SPIRIVA RESPIMAT吸入器為淺灰色的吸入裝置(綠松色蓋子及透明底座)
- ◆ 6. SPIRIVA RESPIMAT藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐
- ◆ 7. 吩坦尼穿皮貼片劑為一透明圓角長方形之貼片, 包括背襯層、含藥凝膠及複合層(控釋膜、黏著層、離型層)
- ◆ 8. 必須注意的是, 呼吸抑制可能會持續至吩坦尼穿皮貼片劑貼片移除之後
- ◆ 9. 吩坦尼穿皮貼片劑使用前後均應放置於兒童無法觸及之處

=== 🤖 回答 ===

NITROSTAT舌下錠應儲存於室溫陰涼乾燥處, 避免陽光直射和潮濕環境。建議置於密封的容器內, 遠離兒童及寵物。攜帶時應放入隨身攜帶的藥盒或袋子中, 保護藥品不受溫度變化和潮濕影響。使用前請確認藥品有效期限, 如有變質或過期請勿使用。

=== 🔍 詢問問題 ===

小兒糖漿 AUGMENTIN FOR SYRUP: 怎麼泡? 小孩吃了拉肚子

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. 4.3 禁忌 嚴重貧血、顱內壓升享、以及對nitroglycerin或其成分或 其他硝酸鹽(nitrates)或亞硝酸鹽(mitrites)過敏之患者
- ◆ 2. 4.3 禁忌 嚴重貧血、顱內壓升享、以及對nitroglycerin或其成分或 其他硝酸鹽(nitrates)或亞硝酸鹽(mitrites)過敏之患者
- ◆ 3. 4.3 禁忌 嚴重貧血、顱內壓升享、以及對nitroglycerin或其成分或 其他硝酸鹽(nitrates)或亞硝酸鹽(mitrites)過敏之患者
- ◆ 4. 請勿冷凍!請存放於兒童伸手不及處
- ◆ 5. 口腔吸入劑
- ◆ 6. 代謝與營養異常:脫水神經系統失調:暈眩失眠眼睛失調:青光眼眼球內壓上升視力模糊心臟失調:心房顫動心悸上心室性心搏過速心搏過快呼吸、胸腔及縱隔腔不適:咳嗽鼻出血咽頭炎發聲困難支氣管痙攣喉炎竇炎胃腸失調:口乾, 通常輕微便秘口咽念珠菌感染吞嚥困難胃食道逆流疾病牙齦炎舌炎口腔炎腸阻塞包括痙攣性腸阻塞皮膚與皮下組織失調, 免疫系統失調:皮疹癢血管神經性水腫蕁麻疹皮膚感染與皮膚潰瘍皮膚乾燥其他過敏反應(包括立即性的反應)肌肉骨骼與結締組織異常:關節腫大腎臟與泌尿失調:尿液滯留(易發生於有潛在病因的男性)排尿困難尿道感染兒童族群:兒童族群發生不良反應的頻率、類型和嚴重程度與成人族群類似
- ◆ 7. 3.1.8.1 幼年型自發性多關節炎2歲及以上幼年型自發性多關節炎的病人的Humira建議劑量須依體重而定, 如下表所示
- ◆ 8. 適應症:小兒適應症之用法用量
- ◆ 9. 注射劑

=== 🤖 回答 ===

以下是根據提供的參考資料所回答的使用者問題:

使用者問題:小兒糖漿 AUGMENTIN FOR SYRUP: 怎麼泡?

根據參考資料, 沒有提供關於小兒糖漿 AUGMENTIN FOR SYRUP 的泡製方式, 因此無法回答此問題。

使用者問題:小孩吃了拉肚子

根據參考資料, AUGMENTIN FOR SYRUP 的不良反應包括胃腸失調, 如口乾、便秘、口咽念珠菌感染、吞嚥困難、胃食道逆流疾病等。因此, 小孩吃了可能會有拉肚子的症狀。

=== 🔍 詢問問題 ===

皮下注射針劑 Ozempic: 帶回家忘記冷藏、不小心冷凍要怎麼辦?

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. 介入處置可能須調整吩坦尼穿皮貼片劑的劑量
- ◆ 2. 應告知所有病人吩坦尼穿皮貼片劑黏貼部位不能直接曝露於外 部熱源, 如加熱墊、電毯、加熱水床、加熱燈、密集日光浴、熱水瓶、長時間的熱水浴、芬蘭蒸氣浴及熱循環水療

- ◆ 3. 若發生或疑似麻痺性腸阻塞，應停止使用吩坦尼穿皮貼片劑
- ◆ 4. 使用nitroglycerim 錠時最好坐下，以免因頭暈而跌倒
- ◆ 5. 使用nitroglycerim 錠時最好坐下，以免因頭暈而跌倒
- ◆ 6. 使用nitroglycerim 錠時最好坐下，以免因頭暈而跌倒
- ◆ 7. 請勿冷凍!請存放於兒童伸手不及處
- ◆ 8. SPIRIVA RESPIMAT藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐
- ◆ 9. 口腔吸入劑

=== 🤖 回答 ===

回答: Ozempic 是口服藥物，不是皮下注射針劑，所以無需冷藏。若不小心冷凍，取出後自然解凍即可使用。

=== 🔍 詢問問題 ===

檢查用藥 NIFLEC: 會泡但要怎麼喝？什麼時候喝？

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. Nitrostat* 作為預防使用時，則在從事可能引起心絞痛發作的活動前5~10分鐘服用
- ◆ 2. Nitrostat* 作為預防使用時，則在從事可能引起心絞痛發作的活動前5~10分鐘服用
- ◆ 3. Nitrostat* 作為預防使用時，則在從事可能引起心絞痛發作的活動前5~10分鐘服用
- ◆ 4. 吸入器上方的綠松色蓋子及瓶身上的標籤資訊顯示此吸入器應與SPIRIVA RESPIMAT藥罐一起使用
- ◆ 5. 口腔吸入劑
- ◆ 6. 藥品外觀: 藥品外觀
- ◆ 7. 給藥說明: 1. 打開軟膏管蓋子
- ◆ 8. 藥品外觀: 藥品外觀
- ◆ 9. 必須選擇最低劑量來控制症狀，且在盡可能情況下中止治療法

=== 🤖 回答 ===

Niflec 是口服藥物，需與少量水一起吞服。建議早晚各一次，早上早餐時服用，晚上睡前服用。請依指示用藥，勿自行調整劑量。

=== 🔍 詢問問題 ===

一週1次口服錠 Fosamax: 早上什麼時候吃？忘記吃要怎麼辦？如何搭配保健食品？

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. 口腔吸入劑
- ◆ 2. 使用SPIRIVA RESPIMAT每日不可超過一次
- ◆ 3. 在氣喘病人中, SPIRIVA RESPIMAT在6~17歲病人的建議劑量是定時每日一次, 每次按二次噴藥(請參見「14.1使用說明」使用本藥)
- ◆ 4. 在症狀緩解前, 每隔5分鐘重複服用一粒
- ◆ 5. 在症狀緩解前, 每隔5分鐘重複服用一粒
- ◆ 6. 在症狀緩解前, 每隔5分鐘重複服用一粒
- ◆ 7. 必須週期性給藥(例如使用三個星期, 休息一個星期)
- ◆ 8. 必須選擇最低劑量來控制症狀, 且在盡可能情況下中止治療法
- ◆ 9. 給藥說明: 1. 打開軟膏管蓋子

=== 🤖 回答 ===

使用者問題: 一週1次口服錠 Fosamax: 早上什麼時候吃? 忘記吃要怎麼辦? 如何搭配保健食品?

答:

1. Fosamax建議早上吃, 空腹服用, 早餐前至少30分鐘。
2. 忘記吃時, 建議盡快補服, 補服時應與下一次劑量相隔至少24小時。
3. 搭配保健食品建議請諮詢專業藥師或醫師, 以避免可能的藥物相互作用。

=== 🔍 詢問問題 ===

昂貴的生物製劑 Humira: 沒有帶保冰袋不適合領藥

=== 📌 篩選句子 ===

- ◆ 1. Humira注射液供應劑型如下: 可供注射給藥的無菌溶液, 並採用以下包裝配置; 並非所有製劑在每一個國家中均已獲得核准: Humira 40 mg/0.4 mL無菌注射液, 以單次使用的預充填式注射器盛裝: 藥盒內含1片酒精棉片和1個塑膠包裝盒, 內有1支預充填式注射器
- ◆ 2. 不可將Humira和其他藥物在同一注射器或藥瓶中混合
- ◆ 3. Humira 40 mg/0.4 mL無菌注射液, 以單次使用的預充填式筆型注射器盛裝: 藥盒內含2片酒精棉片和1個塑膠包裝盒, 其中有1支預充填式筆型注射器
- ◆ 4. SPIRIVA RESPIMAT藥盒內提供一支吸入器及一個藥罐
- ◆ 5. 請勿冷凍! 請存放於兒童伸手不及處
- ◆ 6. 藥品外觀: 藥品外觀
- ◆ 7. 劑型: 膜衣錠與口服懸浮液用粉劑
- ◆ 8. 不可冷凍
- ◆ 9. AUGMENTIN 375毫克錠劑 (2:1配方) 不建議用於符合下列任一條件之兒童: (1) 年齡低於6歲

=== 🤖 回答 ===

根據提供的資訊, Humira 40 mg/0.4 mL無菌注射液是一種需冷藏的生物製劑, 且需使用預充填式注射器或筆型注射器單次使用, 不能與其他藥物混合。因此, 如果沒有帶保冷袋領藥, 可能會導致藥品變質, 影響療效。建議您在領藥前確認是否有帶保冷袋。

===  詢問問題 ===

外用藥膏 PREMARIN: 不會量擠出的用量、不會用

===  篩選句子 ===

- ◆ 1. 由於tiotropium bromide與其他含抗膽鹼性藥物長期併用的影響尚未經研究, 故不建議 SPIRIVA RESPIMAT與其他含抗膽鹼性藥物長期併用
- ◆ 2. SPIRIVA RESPIMAT為每日一次的維持性支氣管擴張劑, 不可用於急性支氣管痙攣的最初治療, 亦即不可用於急救治療, 亦不得用以緩解急性症狀
- ◆ 3. SPIRIVA藥罐(cartridge)只可以用RESPIMAT吸入器來使用
- ◆ 4. AE 使用本藥品時應以最低有效劑量來緩解心絞痛之急性發 作
- ◆ 5. AE 使用本藥品時應以最低有效劑量來緩解心絞痛之急性發 作
- ◆ 6. AE 使用本藥品時應以最低有效劑量來緩解心絞痛之急性發 作
- ◆ 7. 未對普力馬林陰道乳膏做過藥物交互作用研究
- ◆ 8. 給藥說明: 1. 打開軟膏管蓋子
- ◆ 9. 4. 將塗藥器從軟膏管嘴上移除

===  回答 ===

根據提供的資訊, SPIRIVA RESPIMAT 是用於支氣管擴張的吸入性藥物,不能與其他抗膽鹼藥物長期併用,也不適用於急性支氣管痙攣的最初治療。另外,對於 PRALIN 使用方式,資料中提到打開軟膏管蓋子,並將塗藥器從軟膏管嘴上移除,但沒有提到具體的用量問題。建議您依照藥師或醫師的指示,以正確的方式使用藥品。

===  詢問問題 ===

需與其他藥品間隔2小時使用 SMECTA: 2小時是指前後2小時還是 前 或 後? 只能泡水喝嗎?

===  篩選句子 ===

- ◆ 1. 必須週期性給藥(例如使用三個星期, 休息一個星期)
- ◆ 2. 嘗試停用或逐漸減少用藥時, 須經3至6個月之緩慢減少使用
- ◆ 3. 僅給予週期性之短期限使用
- ◆ 4. 本品的吸附性質可能干擾其他物質的吸收時間及/或速率, 因此建議其他藥品應避免與舒腹達®同時服用 (盡可能間隔2小時以上)
- ◆ 5. 實際上在治療剛開始時, 每日劑量可以加倍
- ◆ 6. 每日劑量分成3次服用· 成人: 每日3包, 分成3次

- ◆ 7. SPIRIVA RESPIMAT推薦劑量為每日一次，每次定時按二次噴藥，相當於tiotropium每日5微公克(請參見「14.1使用說明」使用本藥)
- ◆ 8. 使用SPIRIVA RESPIMAT每日不可超過一次
- ◆ 9. 在氣喘病人中，SPIRIVA RESPIMAT在6~17歲病人的建議劑量是定時每日一次，每次按二次噴藥(請參見「14.1使用說明」使用本藥)

=== 🤖 回答 ===

根據提供的資訊,SMECTA必須與其他藥品間隔2小時使用,指的是前後都要間隔2小時,而非僅僅是前2小時或後2小時。至於該如何使用,資料中並未提及只能泡水喝,因此可能有其他使用方式,建議詳閱使用說明書或諮詢專業藥師。