

Неврология.

Урок 4 | Тема 4.

Сотрясение мозга, препараты для острой помощи и отдаленных последствий

- Арника
- Натриум сульфурикум
- Гиперикум
- Цикута
- Гиосциамус
- Геллеборус
- Цинк

АРНИКА

Это первый препарат, если мы видим симптомы сотрясения.

- Боится прикосновения или чьего-то приближения
- Бессознательное состояние: на вопрос отвечает правильно, но затем снова впадает в прежнее состояние
- Безразличие; не может длительно продолжать активную работу
- Нервозность; не переносит боли; повышенная чувствительность тела
- Утверждает, что ничего особого с ним не происходит
- Стремится оставаться один
- Состояние после умственного перенапряжения или же психического шока
- Голова горячая, а тело холодное; спутанность мыслей;
- Ощущение стягивания волосистой части головы; холодные точки на лбу
- Двоение в глазах после травмы, кровоизлияние в сетчатку
- Болезненное ощущение в глазах, как от ушибов, после работы глаз на близком расстоянии
- Старается держать глаза открытыми: при их закрытии испытывает головокружение

- Шум в ушах из-за прилива крови голове
- Внезапная острая (стреляющая) боль в ушах и вокруг них.
- Кровотечение из ушей. Притупление слуха после сотрясения мозга
- Боль в хрящах ушной раковины, как от ушиба
- Сухость и жажда, горький привкус во рту или вкус как от тухлого яйца
- Кровавая рвота, зловонная. В желудке ощущение давления, как от камня

✓ НАТРИУМ СУЛЬФУРИКУМ

СОСТОЯНИЕ УХУДШАЕТСЯ ПРИ ТЕПЛОЙ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЕ - ВЕСЕЛЫЙ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ

Психические симптомы:

- Ненависть жизни, СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ о том, чтобы застрелиться, но его останавливают мысли о горе, которое он может причинить родственникам.
- ВЕСЕЛЫЙ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ.
- ПСИХИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПОСЛЕ ТРАВМ ГОЛОВЫ ИЛИ ПОЗВОНОЧНИКА (путаница, отупение, печаль, безумие).
- Привередливый, слишком сильное чувство долга.

Физические симптомы:

- ХУЖЕ ВО ВЛАЖНУЮ ПОГОДУ.
- Чувствует каждое изменение погоды от сухой до влажной.
- Затрудненное астматическое дыхание, хуже с 04:00 до 05:00, хуже во влажную, сырую погоду.
- Диарея с громким метеоризмом при подъеме и движении.
- Диарея от внезапной радости, после жирной пищи, во время желтухи.
- БОЛЕЗНЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, ХУЖЕ СЛЕВА (специализированное лекарственное средство).
- Заболевания печени и желчного пузыря (воспаление, опухоль, увеличение, атрофия, застой, камни в желчном пузыре, и т.д.).
- Бородавки. Красные и мягкие кондиломы.
- Болезни после черепно-мозговых травм (головная боль, головокружение, психические симптомы).
- Светобоязнь во время головной боли.

Модальности:

ХУЖЕ: влажная погода, особенно теплая, мучное, фрукты, овощи, картофель.

ЛУЧШЕ: после дефекации, диарея, нахождение под открытым небом.

ЖЕЛАНИЕ: холодные напитки, соленая рыба, лед, пиво.

ОТВРАЩЕНИЕ: кислое молоко и йогурт, пиво, хлеб.

ГИПЕРКУМ

ТРАВМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Психические симптомы:

- ПСИХИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ОТ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ: депрессия, изнеможение, отупение.
- Сверхчувствительность к боли.
- Наваждение, что он слышит голоса мертвых людей.
- Делает ошибки в письме, пропускает буквы.
- ТРАВМЫ НЕРВОВ С СИЛЬНОЙ БОЛЬЮ.
- Травма крупных нервов, например, повреждения и разрывы срединного нерва.
- Судороги в результате травм головы или позвоночного столба. Сотрясение.
- Травмы частей тела, в которых много нервов, особенно кончики пальцев рук, пальцы ног и копчик, позвоночник, ногти, глаз, голова. Контузия позвоночника, сотрясение мозга. Повреждения зубных нервов.
- Рваные, раздробленные кончики пальцев.
- Зазубренный язык.
- Раздирание рук.
- Плохие последствия от падений или ударов о голову или копчик. Ушибленный копчик после родов, после падения или травмы.
- Астматическое дыхание после повреждения позвоночника.
- Боль, простреливающая вверх, вдоль нерва.
- Боль внезапно появляется и постепенно исчезает.
- Фантомные боли (боль после ампутации).
- Предотвращает тризм, тетанические судороги, тетаническую ригидность.

-:Головная боль, распространяющаяся на скуловую кость, щеку. Ощущение, словно голова поднята высоко в небо.

- Бурситы и мозоли с мучительной болью.

- Боль в деснах после удаления зубов.

Модальности:

ХУЖЕ: холод (воздух, замерзание), туманная погода

Желание: теплые напитки

Геллеборус

Этот препарат производит оцепенение при любом типе жалоб, будь то мигрень, которая вызывает временное помутнение сознания или в случаях органических повреждений мозга. Оцепенение, по описанию Ганемана, - это состояние, при котором мы видим пациента, который - «хотя у него нет поражения зрения - ничего не видит отчётливо; его слух - «хотя у него и абсолютно здоровый - совершенно не в состоянии отчётливо воспринимать звуки». Пациент кажется отрезанным от мира и от своих собственных мыслей и чувств. Он медленно и с большим трудом отвечает. Его память, концентрация внимания почти парализованы. Порой он не чувствует почти никаких эмоций; становится безразличным к своему окружению. В другое время его состояние может быть просто ужасным, и больной чувствует, как будто с ним случится что-то неопишное или какая-нибудь катастрофа. Также может возникать сильное раскаяние и чувство вины.

- Травма головы с отупением и спутанностью сознания.

- Сотрясение мозга.

- Хмурит брови, морщит лоб, особенно когда пытается думать.

- ЧЕЛОВЕК ПОГРУЖЕН В МЫСЛИ.

- Человек отвечает медленно, думает долго перед тем, как ответить.

- Слабость памяти. Забывает то, что он только что прочитал, сказал, услышал или сделал.

- Нерешительность.

- Человек находится в ОТЧАЯНИИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЗВОЛНОВАН и ищет помощи.

- Дыхание уменьшает волнение.

Физические симптомы:

- Болезни после менингита, энцефалита, сотрясения мозга, инсульта, испуга, горя, подавленных высыпаний на коже.
- Менингит, энцефалит с оцепенением (помрачением сознания).
- ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВОЙ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, движение челюсти, словно при пережевывании, постоянное движение губ без произнесения слов, вдавливают голову в подушку, выражение ОТСУТСТВИЯ (ПУСТОТЫ), мозговой крик.
- Трясёт головой, чтобы рассеять дикое ощущение внутри.
- Бьёт себя по лбу и потирает лоб, когда пытается сосредоточиться.
- Испуганный, просящий или вопрошающий взгляд.
- Головная боль с оцепенением.
- Голова пустая; почти никакого движения мыслей.
- Трудно сосредоточиться.
- Умственная деятельность замедленна, отвечает медленно и с большим трудом.
- Оцепенение и умственное оупение.
- Депрессия. Апатия и безразличие.
- Мучительное состояние; не может понять, что случилось; просит помощи.
- Должен быть постоянно сосредоточен на том, чем он занимается, иначе - « его руки забывают, что делали».
- Моча темно-красного, почти черного цвета, в скудном количестве, с осадком цвета молотого кофе.
- Испражнения с бесцветной, прозрачной, вязкой слизью.
- Озноб начинается с рук. Внутренний озноб, особенно в положении лежа.
- Морщинистые брови.

Модальности:

ХУЖЕ: с 16:00 до 20:00, холодный воздух

✓ Цинк (цинкум металликум)

«Гиперактивность» - подходящее описание для пациентов Цинк, причем она проявляется в основном в подвижности ног и психических реакциях. Мы видим постоянное движение ступней, подергивание, спазмы, судорожные движения. Обычно в момент засыпания происходит электрическая стимуляция, проявляющаяся в подергивании нижних конечностей. На уровне психики также наблюдается ощущение беспокойства. Головной мозг перевозбужден, но не так,

как в случаях Вератрум альбум и . и Коффея. В случае Цинк повышенная активность вызывает своего рода неудовлетворенность. Это один из основных препаратов при неудовлетворенности и жалобах.

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Психические симптомы:

- НЕУГОМОННЫЙ. ГИПЕРАКТИВНЫЙ.
- Активная концентрация. - 'Мозговое истощение' как следствие избыточного учения.
- Умственное оупение. Повторяет вопрос перед тем, как ответить. Понимает вопрос только после повторения.
- Стенание, жалобы, особенно, что с ним плохо обращаются другие. Мучает всех своими жалобами.
- Наваждение, что за ней стоит бес, хуже во время менструации. Наваждение, что ее вот-вот арестуют.
- Видит бесов, призраков.
- Чувствительность к шуму, к голосам.
- ;Нерасположенность к разговору.

Физические симптомы:

- ГИПЕРАКТИВНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (особенно поражаются нервные окончания).
- НЕУГОМОННОСТЬ конечностей, особенно НОГ - в кровати или в положении сидя.
- Вздрагивание конечностей во время сна.
- Подергивание, лицевые спазмы, эпилепсия, особенно после подавления кожных высыпаний, хуже после воздействия солнца. Конвульсии, когда высыпания не могут прорваться.
- Конвульсии во время прорезывания зубов при бледном лице.
- Болезни от подавленных высыпаний: мания, коматозный сон, неврологические жалобы, конвульсии, бессознательное состояние, хорея, чесотка.
- Сильное сексуальное желание, ухудшение перед менструацией.
- Недостаточная жизнеспособность - отсутствие реакции. Слишком большая слабость, чтобы развить менструальную функцию, чтобы откашляться, помочиться, осмыслить что-либо.

- Ощущения жжения по всей длине позвоночника, хуже при сидении, лучше при ходьбе.
- Мокрота кровянистая с сухим кашлем с утра перед менструацией.
- Нетерпимость к вину, при общем желании спиртных напитков.

Модальности:

ХУЖЕ: сидение, во время сна, после еды, после завтрака, употребление вина, после прививки.

ЛУЧШЕ: растирание, во время приема пищи, движение, влажная погода, ходьба, нахождение под открытым небом, во время менструации.

ОТВРАЩ.: телятина, рыба, конфеты.

ЦИКУТА

Один из препаратов для лечения последствий травм головы.

Это важное средство для лечения нервной системы. Ментальное состояние характеризуется рябчивостью и повышенным возбуждением. Судороги этого препарата - наиболее сильные среди всех судорожных средств и часто сопровождаются причудливыми конвульсиями. Часто наблюдается бессознательное состояние, сон или полусонное состояние, возникающие после приступа судорог, продолжавшихся на протяжении необычно долгого времени, даже в течение целого дня. И иногда наблюдается серия судорожных приступов, следующих друг за другом.

Сознание

- Ребячливость
- Замедленное восприятие после травмы головы
- Отвращение к компании
- Бред. Деменция
- Тревога, подозрительность. Тревожность перед началом судорог

Нервная система

- Сильные судорожные припадки. Корчи
- Судорожные припадки после травмы головы
- Пациент пронзительно кричит перед началом приступа судорог
- Голова откинута назад; спазм в шейном отделе позвоночника
- У пациента наблюдается страшные массы во время приступа судорог

Физические симптомы:

- Страстное желание пациентом несъедобных вещей - грязи или угля
- Ощущение толчков, ударов животе
- Спина выгибается дугой во время приступа судорог
- Спазмы подергивание конечностей

✓ ГИОСЦИАМУС

У пациента Гиосциамус проявляется ревность, зависть. Это не просто чувство ревности. Пациентом владеет желание напасть и убить с холодной расчетливостью. Они могут стать параноиками, подозревающими, что другие плетут заговор с целью навредить им.

Сексуальность извращена, они постоянно касаются своих гениталий (особенно дети) и довольно много мастурбируют. Другое извращение состоит в том, что им нравится говорить о фекалиях или даже играть с ними.

Характерно отсутствие стыда. Мы видим тенденцию к демонстрации своей наготы. Они ходят по дому обнаженными, оставляют дверь туалета открытой и могут стать эксгибиционистами.

**РЕВНОСТЬ, ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ, КАСАНИЕ ГЕНИТАЛИЙ,
БЕЗЗАСТЕНЧИВОСТЬ**

Психические симптомы:

- РЕВНИВЫЙ. Болезни вызванные ревностью. Желание убить, внезапные порывы. Желание напасть.
- ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ, думает, что его хотят отравить, что против него вынашивают какой-либо заговор.
- БЕССТЫДНЫЙ в присутствии другого человека.
- Непристойное поведение. ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПОКАЗ СВОИ ГЕНИТАЛИИ. Снимает одежду очень легко, хочет быть голым.
- Похотливость. Нимфомания. Извращения.
- ИГРАЕТ С КАЛОМ, МОЧОЙ, И ВЕЩАМИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ОТВРАЩЕНИЕ. Говорит о моче, кале, гениталиях без всякого стыда, а, скорее даже, с удовольствием. Катает кал по полу.
- ОДЕРЖИМОЕ поведение, настойчивые мысли.
- Постоянно считает один, два, три, один два три и т.д. Повторяет слова и т.д.

- Болтливость. Бредит в то время, как сам он говорливый, маниакальный, агрессивный, жестокий, что-то бормочет.
- Поспешная, несвязная речь.
- Grimасы лица.
- Боязнь воды.

Физические симптомы:

- ДЕРЖИТ В РУКАХ СВОИ ГЕНИТАЛИИ. Лежит в кровати, сложив руки между бедрами.
- Беспокойные руки, КОПАЕТСЯ В ПОСТЕЛЬНОМ БЕЛЬЕ.
- Судороги, подергивание, спазмы, конвульсии.
- Звнящий шум в ухе перед приступом эпилепсии.
- Скрежет во время эпилепсии.
- Кашель - постоянный, спазматический, сухой, хуже в положении лежа.

Модальности:

ОТВРАЩЕНИЕ: вода, напитки, помидоры.