

1. Em virtude principalmente dos baixos índices pluviométricos registrados nos últimos anos, o Nordeste Brasileiro encontra-se enfrentando atualmente sérios problemas de escassez hídrica. Historicamente, a proposta de solução para esta deficiência foi a implantação de um programa de açudagem. Os quatro açudes construídos no Estado do Ceará com maior capacidade de armazenamento de água são:

- a) Castanhão, Orós, Pacoti e Pacajus.
- b) Castanhão, Orós, Banabuiú e Araras.
- c) Castanhão, Orós, Pedra Branca e Acarpe do Meio.
- d) Castanhão, General Sampaio, Pacoti e Orós.

2. O Ceará apresenta evidências dos processos de desertificação em várias áreas, destacando-se as seguintes regiões:

- a) Litoral, Cariri e Inhamuns.
- b) Inhamuns, Irauçuba e Litoral.
- c) Inhamuns, Irauçuba e Jaguaribe.
- d) Cariri, Jaguaribe e Litoral norte.

3. O Ministério do Meio Ambiente identificou no Nordeste brasileiro quatro regiões como de alto risco à desertificação, ficando as mesmas conhecidas como Núcleos de Desertificação. Assinale a opção CORRETA que contém a relação dessas quatro áreas.

- a) Inhamuns-CE, Irauçuba-CE, Seridó-RN e Sertão Central Baiano-BA.
- b) Irauçuba-CE, Cabrobó-PE, Seridó-RN e Sertão do Alto São Francisco-BA.
- c) Gilbués-PI, Inhamuns-CE, Irauçuba-CE e Sertões de Souza-PB.
- d) Irauçuba-CE, Cabrobó-PE, Seridó-RN e Gilbués-PI.

4. No Estado do Ceará, o período chuvoso ocorre ao longo do primeiro semestre e sua distribuição espacial não ocorre de forma homogênea, existindo regiões que são mais beneficiadas pelas chuvas do que outras. As regiões que historicamente possuem os maiores totais pluviométricos, no Estado do Ceará, são:

- a) Cariri, Maciço de Baturité e Jaguaribana.
- b) Sertão Central, Jaguaribana e Ibiapaba.
- c) Litoral, Maciço de Baturité e Cariri.
- d) Jaguaribana, Litoral e Inhamuns.

5. O Estado do Ceará possui uma linha de costa com aproximadamente 573 km de extensão. Entre os principais ambientes naturais presentes no litoral cearense, podemos destacar:

- a) dunas móveis, dunas fixas e planícies fluviomarinhas revestidas por manguezais.
- b) inselbergs, tabuleiros pré-litorâneos e planícies fluviais.
- c) dunas, falésias e vegetação de caatinga.

d) manguezais, dunas e planaltos sedimentares.

6. A compartimentação geomorfológica do Estado do Ceará apresenta características resultantes de eventos naturais que ocorreram principalmente no Pleistocênio. Na referida compartimentação encontram-se relevos desenvolvidos em terrenos do embasamento cristalino ou em áreas sedimentares, dentre os quais podemos destacar:

a) Planalto do Médio Jaguaribe, Depressão sertaneja, Planalto da Ibiapaba.

b) Planaltos sertanejos, Depressão sertaneja e Chapada do Araripe.

c) Depressão sertaneja, Planaltos sedimentares e Glacis de acumulação pré-litorâneos.

d) Planalto da Borborema, Depressão sertaneja e Planaltos do médio Jaguaribe.

7. A Depressão sertaneja é um dos principais compartimentos geoambientais do ambiente semiárido do Estado do Ceará cujas características dominantes são:

a) pouca diversificação litológica, drenagem intermitente, solos espessos com pouca variedade de associações e extensivamente recobertos pela vegetação de tabuleiros.

b) acentuada diversificação litológica, drenagem intermitente, solos com grande variedade de associações e extensivamente recobertos por Caatingas.

c) predomínio de rochas sedimentares, drenagem intermitente, predomínio de solos profundos e com pouca variedade de associações, encontrando-se extensivamente recobertos pela vegetação de caatinga.

d) superfície plana ou suavemente inclinada com solos espessos e predominantemente revestida pela vegetação do cerrado

8. O Parque Ecológico do Rio Cocó é uma Unidade de Conservação de grande importância para o município de Fortaleza e para a biodiversidade que é protegida. Com relação ao rio Cocó, é CORRETO afirmar.

a) O Rio Cocó faz parte da bacia do rio Jaguaribe, nasce na vertente oriental da Serra de Maranguape e seu percurso passa pelos municípios de Maracanaú e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico.

b) O Rio Cocó faz parte da bacia dos rios do litoral leste cearense, nasce na vertente oriental da Serra de Baturité e seu percurso passa pelos municípios de Redenção, Guaiuba, Pacatuba e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico.

c) O Rio Cocó nasce na vertente oriental da Serra de Maranguape e seu percurso passa pelos municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico.

d) O Rio Cocó nasce na vertente oriental da Serra da Aratanha e seu percurso passa pelos municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico.

9. Entre os principais sistemas ambientais situados no Parque Ecológico do Rio Cocó, podemos identificar:

a) vegetação de tabuleiros e vegetação de caatinga.

b) depressão sertaneja e área de inundação sazonal.

c) planície fluviomarinha e lajedos.

d) planície litorânea e planície fluviomarinha.

10. Com relação à população economicamente ativa do município de Fortaleza, assinale o item que identifica os três setores de atividade que possuem o maior número de empregos formais no município de Fortaleza (IPECE, 2014). IPECE, Perfil básico municipal de Fortaleza, SEPLAG, Ceará, 2014

a) Construção Civil, Agropecuária e Serviços.

b) Comércio, Serviços e Indústria de transformação.

c) Comércio, Serviços e Administração pública.

d) Administração pública, Serviços e Indústria de transformação.

11. Assinale a opção que descreve CORRETAMENTE o período chuvoso no estado do Ceará.

a) Historicamente as regiões do litoral e sertão cearense têm seu quadrimestre mais chuvoso situado entre os meses de fevereiro e maio, enquanto o quadrimestre mais chuvoso na região do Cariri cearense é de janeiro a abril.

b) Analisando a pluviometria média anual dos últimos quarenta anos, no estado do Ceará, verifica-se que as maiores médias pluviométricas anuais foram registradas na região dos Inhamuns e na região jaguaribana.

c) A região do semiárido cearense possui uma média histórica pluviométrica anual muito superior à que se encontra registrada para a região do litoral cearense.

d) Historicamente os maiores totais pluviométricos no estado do Ceará são registrados entre os meses de outubro e janeiro e os menores de fevereiro a maio.

12. O Jaguaribe é o principal rio do estado do Ceará e sua bacia hidrográfica drena uma área de aproximadamente 48% do território cearense. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao rio Jaguaribe-CE.

a) Suas nascentes encontram-se situadas na serra da Joanelha, no município de Tauá-CE, e sua foz no oceano Atlântico, na divisa dos municípios cearenses de Fortim e Aracati.

b) Entre os principais açudes que têm suas barragens situadas no rio Jaguaribe, encontram-se o Orós, o Araras e o Acarape do Meio.

c) Sua bacia hidrográfica abrange quase a metade do estado do Ceará e grande parte dos estados de Pernambuco, Piauí e uma pequena porção do Maranhão.

d) Suas nascentes encontram-se situadas na serra do Machado, porção central do sertão cearense, e sua foz no oceano Atlântico, na divisa dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

13. O estado do Ceará, dentro do processo de elaboração do seu Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-CE, mapeou e caracterizou três núcleos de desertificação: Inhamuns, Irauçuba/Centro-Norte e Jaguaribe. Assinale a opção que cita dois municípios inseridos no Núcleo de Desertificação da Região dos Inhamuns-CE.

a) Santa Quitéria e Boa Viagem.

b) Independência e Tauá.

c) Sobral e Irauçuba.

d) Tauá e Mombaça.

14. De acordo com o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-CE, assinale a alternativa que cita o domínio natural situado no estado do Ceará que onde abriga as maiores áreas suscetíveis aos processos de desertificação.

a) Sertões.

b) Litoral.

c) Serra úmidas.

d) Planícies fluviais.

15. Os tabuleiros pré-litorâneos é uma das unidades geoambientais delimitadas no mapeamento da zona costeira do estado do Ceará (SOUZA, 2003). Assinale a opção que apresenta as características ambientais predominantes no ambiente físico da referida unidade geoambiental.

(SOUZA, M.J.N. Unidades Geoambientais. In: A zona costeira do Estado do Ceará: Diagnóstico para a Gestão Integrada. Fortaleza. AQUASIS:2003)

a) Encontram-se constituídos predominantemente por sedimentos Quaternários da Formação Barreiras e seus solos predominantes são os argissolos profundos e moderadamente profundos.

b) Superfície situada em terrenos do embasamento cristalino, pediplanada a parcialmente dissecada em largos interflúvios tabulares e separados por vales de fundos planos.

c) Faixa praial com superfície arenosa de acumulação marinha e com ocorrência dos Neossolos Quartzarênicos, revestidos predominantemente pela vegetação de caatinga.

d) Entre suas principais características geológicas predominantes, encontram-se a presença de litotipos variados do complexo cristalino pré-cambriano e deformados por tectonismo.

16. As áreas serranas no estado do Ceará encontram-se dispersas pela depressão sertaneja e possuem relevo dissecado em rochas do embasamento cristalino. Entre os ambientes serranos cearenses, destaca-se a serra de Baturité com altitudes superiores a 900 metros. Assinale a alternativa que cita o tipo de vegetação natural predominante na serra de Baturité (IBGE, 2004).

a) Caatinga arbustivo/arbórea.

b) Floresta Ombrófila.

c) Cerrado.

d) Floresta de Araucária.

17. De acordo com o censo demográfico 2010 do IBGE, assinale a alternativa que apresenta os 05 (cinco) municípios mais populosos do estado do Ceará.

a) Fortaleza, Sobral, Pacajus, Eusébio e Juazeiro do Norte.

b) Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixadá, Cascavel e Pindoretama.

c) Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

d) Fortaleza, Caucaia, Sobral, Limoeiro do Norte e Eusébio.

18. O rio Cocó é o principal curso d'água situado na cidade de Fortaleza e suas nascentes encontram-se na serra da Aratanha, município de Pacatuba-CE. Das alternativas abaixo, assinale a que se refere à localização CORRETA da foz do rio Cocó.

a) Nos municípios de Fortaleza e Aquiraz, entre as praias da Sabiaguaba e Porto das Dunas.

b) No município de Fortaleza, entre as praias do Caça e Pesca e Sabiaguaba.

c) Nos municípios de Fortaleza e Caucaia, entre as praias da Barra do Ceará e Iparana.

d) Na praia do Porto das Dunas, município de Aquiraz.

19. O Diagnóstico Geoambiental elaborado para o município de Fortaleza identifica áreas frágeis e áreas medianamente estáveis. Assinale a opção CORRETA que cita exemplos de algumas áreas medianamente estáveis em termos ambientais situadas no município de Fortaleza.

a) Dunas móveis e planícies fluviomarinhas.

b) Planície litorânea e tabuleiros pré-litorâneos.

c) Depressão sertaneja e dunas móveis.

d) Tabuleiros pré-litorâneos e faixa de transição entre Tabuleiros e Depressão sertaneja.

20. Assinale a opção CORRETA que trata dos aspectos pluviométricos predominantes na cidade de Fortaleza.

a) Em termos pluviométricos, a cidade de Fortaleza apresenta uma média histórica do índice de precipitação inferior a 700mm anuais, volume de chuva inferior aos registrados na região semiárida cearense.

b) A circulação atmosférica no município de Fortaleza é comandada principalmente por influências de frentes frias originadas no sul do Brasil, ocorrendo historicamente uma maior concentração de chuvas no mês de janeiro.

c) O município de Fortaleza apresenta uma média histórica do índice de precipitação acima de 1.200mm anuais, volume de chuva superior aos registrados na região semiárida cearense.

d) As precipitações no município de Fortaleza historicamente apresentam acentuada regularidade no decorrer de todos os meses e ao longo dos anos. A média histórica do índice de precipitação é sempre atingida.

21. No município de Fortaleza, as praias se dispõem de modo alongado por toda a costa, sendo interrompidas, em alguns trechos, pelas planícies fluviomarinhas dos rios Ceará, Cocó e Pacoti. Assinale a opção que descreve de forma CORRETA as condições predominantes das referidas planícies fluviomarinhas.

a) São constituídas de sedimentos predominantemente arenosos e com pequenas concentrações de matéria orgânica, condições estas que colaboram para a inexistência de cobertura vegetal.

b) São caracterizadas pela ausência ou fixação da vegetação, favorecendo a mobilidade dos sedimentos por meio de transporte eólico.

c) São formadas por sedimentos arenosos de coloração avermelhada e pela ausência da cobertura vegetal.

d) São constituídas pela deposição de sedimentos predominantemente argilosos e com grandes concentrações de matéria orgânica.

22. Com relação às dunas móveis que ocorrem no litoral de Fortaleza, assinale a alternativa que define CORRETAMENTE as características predominantes das dunas móveis presentes no litoral da cidade de Fortaleza.

a) São compostas por sedimentos em constante mobilização e não apresentam processos pedogenéticos.

b) Trata-se de ambientes com litologia predominantemente sedimentar que proporcionam o desenvolvimento de uma vegetação de porte arbóreo-arbustivo.

c) Verifica-se nas dunas móveis, o desenvolvimento dos processos pedogenéticos, o que permite a garantia de certa estabilidade ambiental.

d) Trata-se de ambientes especiais, sendo submetidos às influências de processos marinhos e com solos profundos e ricos em matéria orgânica em decomposição.

23. Os distritos são territórios em que se subdividem os municípios onde se encontram uma certa autonomia policial, comercial e de equipamentos de saúde, sendo submetidos ao poder da Prefeitura. Assinale a opção CORRETA em que se encontram listados alguns distritos do município de Fortaleza.

(A) Aldeota, Antônio Bezerra, Messejana e Parangaba.

(B) Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim e Parangaba.

(C) Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Messejana e Parangaba.

(D) Aldeota, Messejana, Mondubim e Parangaba.

24. De acordo com FUNCEME (2005), dentre os estados do Nordeste brasileiro, o que detém maior percentual de área inserida no ambiente semiárido é o Ceará, com quase 92% de sua extensão territorial. Marque a opção CORRETA que apresenta algumas características do ambiente semiárido cearense.

(FUNCEME. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Proposta de dimensionamento do semiárido brasileiro. Banco do Nordeste do Brasil. Fortaleza. 2005)

(A) Solos profundos e um regime pluviométrico que proporciona a manutenção de drenagens perenes durante todo o ano.

(B) A distribuição temporal das precipitações é irregular, com concentração do total precipitado no primeiro semestre do ano, os solos são predominantemente rasos e recobertos principalmente pela vegetação de Caatinga.

(C) As condições geológicas e os solos profundos do ambiente semiárido cearense possibilitam que a maioria dos cursos d'água seja perene.

(D) O período de chuvas no ambiente semiárido cearense é bastante variável. Dependendo das condições climáticas, pode se concentrar no decorrer do primeiro semestre, entre os meses de março, abril e maio, ou ao longo do segundo semestre, principalmente no decorrer dos meses de setembro, outubro e novembro.

25. Os recursos hídricos do estado do Ceará encontram-se distribuídos em 12 bacias hidrográficas. Assinale a opção CORRETA, em que se encontram listadas algumas bacias hidrográficas cujos rios drenam suas águas no território cearense.

(A) Acaraú, Açu, São Francisco e Banabuiú.

(B) Jaguaribe, Araguaia, Coreaú e Jaguaribe.

(C) Salgado, Banabuiú, Acaraú e Curú.

(D) Metropolitana, Jaguaribe, Banabuiú e Araguaia.

26. O maciço de Baturité é um dos mais expressivos compartimentos do relevo cearense situando-se na porção norte-ocidental do estado do Ceará. Assinale a opção CORRETA que descreve as características ambientais do maciço de Baturité.

(A) Área de grande importância biológica e em seu contexto ocorrem duas grandes unidades de cobertura vegetal: a mata úmida, que ocupa as altitudes mais altas, e a mata seca, a qual predomina nos setores situados abaixo dos 400 metros de altitude.

(B) Nas feições situadas no maciço de Baturité, há predominantemente a ocorrência de grandes áreas planas e seu ponto mais alto não ultrapassa os 800 metros de altitude.

(C) Nos setores mais altos do maciço de Baturité encontram-se situadas as sedes dos municípios de Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Caridade e Itapiúna.

(D) O maciço de Baturité é formado por rochas sedimentares e nos seus setores mais altos predomina a vegetação de Caatinga e solos rasos.

27. O litoral do estado do Ceará possui uma extensão aproximada de 573 km e, ao longo dele, encontram-se situados 20 municípios. Assinale a alternativa em que todos os municípios listados possuem entre seus limites uma extensão da faixa de praia do litoral cearense.

(A) Aracati, Camocim, Fortim e Itapipoca.

(B) Amontada, Fortaleza, Santana do Acaraú e Uruoca.

(C) Cascavel, Beberibe, Jijoca de Jericoacoara e Chorozinho.

(D) Paracuru, Itarema, Icapuí e Itapajé.

28. A planície litorânea de Fortaleza, no Ceará, é composta por diferentes feições que recebem influências de natureza marinha, eólica e fluvial. Assinale a alternativa CORRETA que lista algumas feições da planície litorânea de Fortaleza.

(A) Planícies fluviais, tabuleiros pré-litorâneos e depressão sertaneja.

(B) Tabuleiros pré-litorâneos, planícies fluviomarinhas e depressão sertaneja.

(C) Dunas móveis, dunas fixas, planícies fluviomarinhas e faixa de praia.

(D) Faixa de praia, tabuleiros pré-litorâneos e depressão sertaneja.

29. A cidade de Fortaleza possui um litoral com 34 quilômetros de extensão e, no Parque Ecológico do Cocó, encontra-se a sua maior área verde. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as principais lagoas situadas no município de Fortaleza.

(A) Lagoa do Banana, lagoa do Paraíso, lagoa do Opaia, lagoa do Porangabuçu e lagoa de Messejana.

(B) Lagoa da Parangaba, lagoa do Uruaú, lagoa do Banana e lagoa de Tatajuba.

(C) Lagoa de Messejana, lagoa da Parangaba, lagoa do Opaia, lagoa da Maraponga e lagoa do Porangabuçu.

(D) Lagoa do Opaia, lagoa do Banana, lagoa de Messejana, lagoa da Parangaba e lagoa do Catu.

30. Os maciços residuais, situados no estado do Ceará, exibem diferenças do ponto de vista altimétrico e quanto à composição litológica, sendo constituídos por rochas do embasamento cristalino. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta alguns exemplos de maciços residuais cearenses.

(A) Serra de Baturité, Serra da Meruoca e Serra de Uruburetama.

(B) Serra da Ibiapaba, Chapada do Apodi e Serra da Meruoca.

(C) Serra das Matas, Serra da Ibiapaba e Chapada do Araripe.

(D) Serra de Baturité, Chapada do Apodi e Chapada do Araripe.

31. Entre as principais unidades de relevo situadas no estado do Ceará, encontram-se os planaltos sedimentares. Assinale a opção CORRETA que apresenta os três principais planaltos sedimentares situados no território cearense.

(A) Serra de Baturité, Chapada da Ibiapaba e Chapada do Araripe.

(B) Chapada do Araripe, Serra da Meruoca e Serra dos Pereiros.

(C) Chapada da Ibiapaba, Chapada do Araripe e Chapada do Apodi.

(D) Serra de Monsenhor Tabosa, Serra de Baturité e Chapada do Araripe.

32. Entre os principais rios situados no município de Fortaleza, podemos destacar:

(A) Rio Cocó e Rio Maranguapinho.

(B) Rio Ceará e Rio Curu.

(C) Rio Cocó e Rio Catu.

(D) Rio Pacoti e Rio Catu.

33. Entre os municípios que fazem limite com Fortaleza, podemos citar:

(A) Eusébio, Aquiraz, Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga.

(B) Caucaia, Aquiraz, Eusébio, Horizonte e São Gonçalo do Amarante.

(C) Aquiraz, Maracanaú, Horizonte, Pacajus e Pindoretama.

(D) Horizonte, Aquiraz, Eusébio, Pacajus e Guaiuba.

34. Entre as unidades de conservação estaduais situadas no município de Fortaleza, podemos citar:

- (A) o Parque Ecológico do Cocó e o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.
- (B) a Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti e a Área de Proteção Ambiental da Serra de Aratanha.
- (C) o Parque Ecológico do Cocó e a Área de Proteção Ambiental Lagamar do Cauípe.
- (D) a Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité e o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.

35. Os sistemas ambientais são áreas dotadas de condições específicas relacionadas, principalmente, aos fatores do potencial ecológico e da exploração biológica. Assinale a alternativa CORRETA, que cita o sistema ambiental situado na planície litorânea do município de Fortaleza, no qual está inserido o Parque Ecológico do Rio Cocó.

- (A) Depressão sertaneja.
- (B) Planalto sedimentar.
- (C) Planície fluviomarinha.
- (D) Maciço residual.

36. O território do estado do Ceará apresenta diferentes unidades de paisagens que têm potencialidades e vulnerabilidades diversificadas. Assinale a alternativa em que todas as unidades de paisagem citadas se encontram situadas no estado do Ceará.

- (A) Agreste, cerrado e planaltos sedimentares.
- (B) Zona da mata, pampa cearense e depressão sertaneja.
- (C) Depressão sertaneja, maciços residuais e planaltos sedimentares.
- (D) Agreste, zona da mata e chapadas.

37. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o bioma que predomina no estado do Ceará

- (A) Caatinga.
- (B) Zona da mata.
- (C) Cerrado.
- (D) Mata atlântica.

38. Entre as áreas do estado do Ceará mais degradadas ambientalmente que apresentam evidências dos processos de desertificação, podemos destacar:

- (A) o planalto da Ibiapaba e a faixa litorânea.
- (B) a região dos Inhamuns e os tabuleiros pré-litorâneos.
- (C) a região dos Inhamuns e a região do médio Jaguaribe.
- (D) os sertões de Canindé e a região do baixo Jaguaribe.

39. Assinale a opção CORRETA, que define o tipo de escoamento superficial que predomina nos rios e riachos situados no ambiente sertanejo do estado do Ceará.

(A) Intermitente.

(B) Perene.

(C) Endorreico.

(D) Efêmero.

40. Marque a opção CORRETA, da qual constam os principais planaltos sedimentares situados no estado do Ceará.

(A) A serra de Baturité e a chapada da Ibiapaba.

(B) A chapada do Araripe e a chapada da Ibiapaba.

(C) O planalto da Borborema e a serra do Machado.

(D) A serra de Baturité e a serra de Maranguape.

41. De acordo com o IBGE (2017), o território brasileiro encontra-se composto por 5.570 municípios. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao número total de municípios situados atualmente no estado do Ceará.

(IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017, disponível em <http://cidades.ibge.gov.br>)

(A) 148.

(B) 176.

(C) 182.

(D) 184.

42. A bacia do rio Jaguaribe ocupa cerca de 48% do território do estado do Ceará, percorrendo aproximadamente 633 km, desde suas nascentes no município de Tauá até sua foz no Oceano Atlântico. Assinale a alternativa CORRETA, em que há alguns dos principais afluentes do rio Jaguaribe.

(A) O rio Banabuiú e o rio Salgado.

(B) O rio Acaraú e o rio Curu.

(C) O rio Pacoti e o rio Coreaú.

(D) O rio Quixeramobim e o rio Aracatiaçu.

43. No que se refere a localização do município de Fortaleza no estado do Ceará, é CORRETO afirmar:

(A) encontra-se situado na porção Norte do estado do Ceará.

(B) encontra-se situado na porção extremo Oeste do estado do Ceará.

(C) encontra-se situado na porção extremo Sul do estado do Ceará.

(D) encontra-se situado na porção extremo Leste do estado do Ceará.

44. Na divisão territorial do município de Fortaleza consta atualmente 05 distritos e 121 bairros. Assinale a alternativa CORRETA que cita os nomes de alguns distritos situados em Fortaleza.

- (A) Pedras, Aldeota, Centro e Benfica.
- (B) Joaquim Távora, Pirambu, Messejana e Mucuripe.
- (C) Antônio Bezerra, Parangaba, Messejana e Mondubim.
- (D) Barra do Ceará, Fátima, Antônio Bezerra e Conjunto Ceará.

45. O estado do Ceará possui aproximadamente 573 km de litoral. Assinale a alternativa CORRETA que apenas consta municípios cearenses que possuem o litoral como parte de seu limite territorial.

- (A) Itarema, Barroquinha, Acaraú e Fortim.
- (B) Ocara, Pentecoste, Miraíma e Aracati.
- (C) Bela Cruz, Chaval, Trairi e Itaíçaba.
- (D) Palhano, Icapuí, Paracuru e Itapiúna.

46. (DAVI COSTA 2022) Uma disputa territorial envolvendo o Piauí e o Ceará por uma área fronteira de 2,8 mil km² pode alterar o mapa dos Estados. O litígio corre no Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2011, quando a Procuradoria Geral do Estado do Piauí reivindicou áreas situadas na divisa entre os entes federados equivalente a treze municípios cearenses.

Fonte: <https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2022/05/09/piaui-e-ceara-disputam-area-de-13-cidades-cearenses-na-justica.html> Acesso em: 23 mai 2022.

01. As treze cidades disputadas pelos dois estados estão na região da (do):

- a) Serra Grande.
- b) Chapada da Ibiapaba.
- c) Chapada do Apodi.
- d) Maciço de Uruburetama.

47. Assinale a opção CORRETA que cita a Unidade de Paisagem que ocupa a maior extensão territorial no estado do Ceará.

- (A) Chapadas.
- (B) Serras.
- (C) Depressão sertaneja.
- (D) Faixa litorânea.

48. Assinale a opção CORRETA que cita três açudes situados no Estado do Ceará que encontram-se entre os 05(cinco) açudes cearenses com maior capacidade de armazenamento de água.

- (A) Acarape do Meio, Pacoti e General Sampaio.
- (B) Castanhão, Orós e Banabuiú.

(C) Castanhão, Pacoti e Gavião.

(D) Orós, Banabuiú e Gavião.

49. O clima é fator determinante das condições ambientais possuindo influências diretas sobre o regime e disponibilidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Assinale a opção que cita o tipo de clima predominante no estado do Ceará.

(A) Tropical Atlântico.

(B) Semiárido.

(C) Equatorial.

(D) Tropical de Altitude.

50. Assinale a alternativa CORRETA que cita o tipo de cobertura vegetal natural predominante em todo o território cearense.

(A) Vegetação de tabuleiro.

(B) Floresta tropical.

© Cerrado.

(D) Vegetação de Caatinga.

51. O açude Castanhão é o maior reservatório d'água situado no território cearense e suas águas são utilizadas principalmente para o abastecimento público, agricultura irrigada e piscicultura. Assinale a alternativa CORRETA que cita a bacia hidrográfica em que fica situado o açude Castanhão.

(A) Bacia do Acaraú.

(B) Bacia do Curú.

© Bacia do Coreaú.

(D) Bacia do Médio Jaguaribe.

52. Ao longo da planície litorânea do município de Fortaleza encontram-se os setores ocupados pela planície fluviomarinha com manguezais. Com relação a estes ambientes é CORRETO afirmar:

(A) Tratam-se de ambientes especiais com alta vulnerabilidade à ocupação e na legislação ambiental brasileira encontram-se como ambientes a serem protegidos.

(B) Estes ambientes são compostos por sedimentos antigos e possuem poucas restrições ao uso e ocupação, apresentando condições propícias à expansão urbana

(C) Corresponde a um complexo florístico com predomínio de espécies caducifólias típicas da caatinga.

(D) Nestes ambientes predominam as áreas quartzosas e ausência de uma cobertura vegetal, sendo que em alguns setores ocorre a vegetação herbácea de pequeno porte.

53. Considerando os biomas brasileiros, assinale o que representa a principal resposta ecológica do ambiente semiárido.

- (A) Pantanal.
- (B) Caatinga.
- (C) Cerrado.
- (D) Floresta tropical.

54. Entre as principais bacias hidrográficas situadas no município de Fortaleza podemos citar:

- (A) Bacia do Rio Coreaú, Bacia do Rio Choró e Bacia do Rio Curú.
- (B) Bacia do Rio Cocó, Bacia do Rio Pacoti e Bacia do Rio Maranguapinho.
- (C) Bacia do Rio Jaguaribe, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.
- (D) Bacia do Rio Cocó, Bacia do Rio Jaguaribe e Bacia do Rio Banabuiú.

55. A principal região hidrográfica situada no estado do Ceará é a do rio Jaguaribe, ocupando aproximadamente 48% do território cearense. Entre os seus principais afluentes podemos citar:

- (A) Rio Acaraú e Rio Curú.
- (B) Rio Coreaú e Rio Banabuiú.
- (C) Rio Banabuiú e Rio Salgado.
- (D) Rio Salgado e Rio Acaraú.