BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Nicardipin**

I. Chỉ định:

- Điều trị tăng huyết áp
- Đường tĩnh mạch: quản lý tăng huyết áp cấp đe doạ tính mạng

II. Liều dùng – cách dùng:

- Một ống 10mg/10ml + 30 ml glucose 5% (tương đương 0,25mg/ml)
- Bắt đầu 10ml/giờ (tương đương 2,5mg/giờ)
- Tăng 5ml/giờ mỗi 10 phút (tương đương 1,25mg/giờ) cho đến khi đạt được mức hạ áp mong muốn, thường trong khoảng 120/70 mmHg – 140/90 mmHg.
- Lưu ý: tối đa tăng 10ml/giờ mỗi 5 phút, tương đương 2,5 mg/giờ, nhưng cần thận trọng với liều này. Không được vượt quá 60ml/giờ (tương đương 15mg/giờ)

III. Cách dùng: Truyền tĩnh mạch

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người hạn chế - Dữ liệu trên động vật gợi ý có nguy cơ
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

Nicardipin Aguettant 10mg/10ml

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**