


Thuốc Regonix 40mg Regorafenib

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ nhà thuốc võ lan phương 0901771516 để được **Võ Lan Phương** bác sỹ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị , **thuốc điều trị ung thư** hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này

Thông tin cơ bản **thuốc Regonix 40mg Regorafenib** điều trị ung thư đại tràng

- Tên thương hiệu: Regonix
- Thành phần hoạt chất: Regorafenib
- Hàm lượng: 40 mg
- Hãng sản xuất: Becon
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Lọ 28 viên nén



Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (1)

Thuốc **Regonix** là gì?

Thuốc Regonix là một chất ức chế đa kinase đường uống liên quan đến hoạt động bình thường của tế bào. Trong các quá trình bệnh lý như ung thư, phát sinh khối u, di căn và miễn dịch khối u. Thuốc regonix giúp điều trị **ung thư đại tràng**, biểu mô đường tiêu hóa và tế bào gan

Thuốc Regonix 40mg có tác dụng gì?

Thuốc Regonix là một chất ức chế phân tử nhỏ của nhiều kinase gắn

màng và nội bào. Liên quan đến các chức năng của tế bào bình thường. Và trong quá trình bệnh lý như phát sinh ung thư, khối u, di căn và miễn dịch khối u.

Trong các thử nghiệm sinh hóa hoặc tế bào trong phòng thí nghiệm. **Thuốc Regonix** hoặc các chất chuyển hóa hoạt động chính của con người M-2 và M-5 đã ức chế hoạt động của RET, VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, KIT, PDGFR-alpha, PDGFR-beta, FGFR1, FGFR DDR2, TrkA, Eph2A, RAF-1, BRAF, BRAF V600E, SAPK2, PTK5, Abl và CSF1R ở nồng độ đã đạt được kiểm định lâm sàng.

Trong thí nghiệm: **Thuốc Regonix** giúp chống angiogen trong mô hình khối u và ức chế sự phát triển khối u. Trong một số mô hình xenograft bao gồm ung thư đại trực tràng, biểu mô đường tiêu hóa và tế bào gan

Chỉ định thuốc Regonix 40mg

Ung thư thực tràng: **Thuốc Regonix 40mg** được chỉ định để điều trị bệnh nhân ung thư thực tràng di căn(CRC). Trước đây đã được điều trị bằng hóa trị fluoropyrimidine, oxaliplatin và irinotecan, một liệu pháp chống VEGF. Nếu điều trị bằng VEGF liệu pháp chống EGFR.



NHÀ THUỐC VÕ LAN PHƯƠNG
0901771516

REGONIX
Regorafenib

40 mg

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giả bao nhiêu (2)

Khối u mô đệm đường tiêu hóa: **Thuốc Regonix 40mg** được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân có khối u mô đệm đường tiêu hóa phát triển, không thể cắt bỏ hoặc di căn (GIST) trước đây đã được điều trị bằng imatinib mesylate và sunitinib malate.

Ung thư biểu mô tế bào gan: **Thuốc Regonix** được chỉ định để điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đã được điều trị trước đó bằng sorafenib.

Xem thêm thuốc điều trị trào ngược dạ dày : Thuốc nexium 40mg mups

Liều lượng sử dụng thuốc Regonix 40mg regorafenib

Liều khuyến cáo: 160mg(4 viên 40 mg)/ lần trong 21 ngày đầu tiên của mỗi chu kỳ 28 ngày. Tiếp tục điều trị cho đến khi bệnh phát triển hoặc kháng thuốc(không được chấp nhận)

Dùng **thuốc Regonix** cùng một thời điểm mỗi ngày. Nuốt cả viên với nước sau bữa ăn ít chất béo, chứa ít hơn 600 calo và 30% chất béo. Không được gấp đôi liều để bù cho liều đã quên

Điều chỉnh liều: Nếu cần phải điều chỉnh liều, hãy giảm 40mg(1 viên). Liều dùng hàng ngày thấp nhất được đề nghị của **thuốc Regonix** là 80 mg mỗi ngày.

Ngừng dùng thuốc Regonix theo những điều sau

- Phản ứng da tay chân cấp 2(HFSR) [hội chứng hồng cầu thực vật (PPES)] tái phát hoặc không cải thiện trong vòng 7 ngày mặc dù đã giảm liều, điều trị gián đoạn trong tối thiểu 7 ngày đối với HFSR cấp 3.
- Triệu chứng tăng huyết áp cấp 2
- Bất kỳ phản ứng bất lợi cấp 3 hoặc 4

- Nhiễm trùng nặng hơn

Giảm liều thuốc Regonix xuống 120mg

- Đối với lần xuất hiện đầu tiên của HFSR cấp 2 trong mọi thời lượng
- Sau khi phục hồi bất kỳ phản ứng bất lợi cấp 3 hoặc 4 ngoại trừ nhiễm trùng
- Đối với tăng 3 aspartate aminotransferase (AST)/ alanine aminotransferase(ALT). Chỉ tiếp tục lại nếu lợi ích tiềm năng vượt xa nguy cơ nhiễm độc gan.

Giảm liều thuốc Regonix xuống 80mg

- Để tái xuất hiện HFSR độ 2 với liều 120 mg
- Sau khi phục hồi bất kỳ phản ứng bất lợi độ 3 hoặc 4 ở liều 120 mg(trừ nhiễm độc gan hoặc nhiễm trùng)

Ngừng thuốc Regonix vĩnh viễn vì những điều sau đây

- Không dung nạp liều 80 mg
- Bất kỳ sự xuất hiện nào của AST hoặc ALT nhiều hơn 20 lần giới hạn trên của mức bình thường(ULN)
- Bất kỳ sự xuất hiện nào của AST hoặc ALT nhiều hơn 3 lần ULN với bilirubin đồng thời nhiều hơn 2 lần ULN

- Tái xuất hiện AST hoặc ALT hơn 5 lần ULN mặc dù giảm liều tới 120 mg
- Đối với bất kỳ phản ứng bất lợi lớp 4, chỉ tiếp tục nếu lợi ích lớn hơn rủi ro

Tác dụng phụ thuốc Regonix 40 mg Regorafenib



Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (3)

Trong quá trình sử dụng **thuốc Regonix 40mg** bạn gặp phải những tác dụng phụ sau đây. Hãy tới ngay cơ sở y tế gần nhất hay bệnh viện để

được chăm sóc y tế. Dưới đây không phải đầy đủ tác dụng phụ.

- Nhức đầu nghiêm trọng, vấn đề tầm nhìn, nhầm lẫn và vấn đề suy nghĩ
- Phát ban và đau ở lòng bàn tay hoặc bàn chân.
- Các vấn đề về tim như đau ngực, khó thở
- Huyết áp tăng: Nhức đầu, mờ mắt hoặc đập vào cổ hoặc tai của bạn
- Vấn đề về gan: Buồn nôn, nôn, khó ngủ, nước tiểu sẫm màu. Vàng da thủng (một lỗ trên dạ dày hoặc ruột của bạn), sốt với đau dạ dày nghiêm trọng, buồn nôn, nôn

Thận trọng khi sử dụng thuốc Regonix 40mg

Thiếu máu cơ tim và nhồi máu

Giữ lại **Thuốc Regonix** ở những bệnh nhân mới hoặc thiếu máu cơ tim khởi phát cấp tính hoặc nhồi máu. Chỉ tiếp tục, sau khi giải quyết cấp tính biến cố thiếu máu cơ tim, nếu lợi ích tiềm năng lớn hơn nguy cơ thiếu máu cục bộ tim

Tăng huyết áp

Không khởi đầu **thuốc Regonix 40mg** trừ khi huyết áp được kiểm soát đầy đủ. Theo dõi huyết áp hàng tuần trong 6 tuần đầu điều trị và sau đó

mỗi chu kỳ, hoặc thường xuyên hơn, như trên lâm sàng chỉ ra. Ngưng tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu các triệu chứng nghiêm trọng hoặc không kiểm soát được tăng huyết áp

Nhiễm độc gan

Nhiễm độc gan nặng do thuốc Regonix đã được ghi nhận ở những bệnh nhân được điều trị, ở các thử nghiệm lâm sàng. Trong hầu hết các trường hợp, rối loạn chức năng gan xảy ra trong vòng 2 tháng đầu điều trị và được chứng minh bởi một mô hình tổn thương tế bào gan.

Có được các xét nghiệm chức năng gan (ALT, AST và bilirubin) trước khi bắt đầu sử dụng **thuốc Regonix**. Và theo dõi tại ít nhất hai tuần một lần trong 2 tháng đầu điều trị. Sau đó, theo dõi hàng tháng trở lên thường xuyên như chỉ định lâm sàng. Theo dõi xét nghiệm chức năng gan hàng tuần ở những bệnh nhân trải qua xét nghiệm chức năng gan tiến triển cho đến khi cải thiện ít hơn 3 lần so với ULN hoặc đường cơ sở


Tạm thời ngưng và sau đó giảm hoặc ngưng vĩnh viễn **thuốc Regonix**.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tồn tại của nhiễm độc gan như biểu hiện bằng các xét nghiệm chức năng gan hoặc hoại tử tế bào gan

Tương tác với thuốc Regonix 40mg

Tác dụng của các chất gây cảm ứng CYP3A4 mạnh: Phối hợp với một chất gây cảm ứng CYP3A4 mạnh với **thuốc Regonix** làm giảm nồng độ trong huyết tương. Tăng nồng độ trong huyết tương của chất chuyển hóa hoạt động M-5, và không làm thay đổi nồng độ trong huyết tương của chất chuyển hóa hoạt động M-2, và có thể dẫn đến giảm hiệu quả. Tránh sử dụng đồng thời với các chất gây cảm ứng CYP3A4 mạnh (ví dụ rifampin, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital)

Tác dụng của thuốc ức chế CYP3A4 mạnh: Phối hợp thuốc ức chế CYP3A4 mạnh với **thuốc Regonix 40mg** làm tăng nồng độ trong huyết tương. Và giảm nồng độ trong huyết tương của các chất chuyển hóa hoạt động M-2 và M-5, và có thể dẫn đến tăng tác dụng phụ. Không nên phối hợp với các chất ức chế CYP3A4 như(clarithromycin, ketoconazole, nefazodone, posaconazole, telithromycin và voriconazole)



Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (4)

Tác dụng của **thuốc regonix 40 mg** đối với chất nền kháng ung thư vú (BCRP): Đồng quản trị *thuốc Regonix* với chất nền BCRP làm tăng nồng độ trong huyết tương của chất nền BCRP. Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân về các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm độc liên quan đến chất nền BCRP (ví dụ methotrexate, fluvastatin, atorvastatin). Tham khảo thông tin sản phẩm cơ chất BCRP đồng thời khi xem xét kiểm nghiệm khi dùng các thuốc này

Sử dụng quá liều Regonix 40mg

Liều cao nhất của **thuốc regonix 40 mg** được nghiên cứu lâm sàng là 220

mg mỗi ngày. Thường xuyên xuất hiện các phản ứng có hại do dùng thuốc quá liều. Bằng việc xuất hiện các dấu hiệu da liễu, chứng khó thở, tiêu chảy, viêm niêm mạc, khô miệng, giảm sự thèm ăn, tăng huyết áp và mệt mỏi. Không có thuốc giải do việc sử dụng quá liều. Trong trường hợp nghi ngờ quá liều, ngừng dùng **thuốc Regonix**. Tới ngay bệnh viện để được chăm sóc y tế. Cũng như nhận được những lời khuyên của bác sĩ về việc sử dụng thuốc Regonix 40mg

Bảo quản thuốc Regonix 40mg

Lưu trữ **thuốc Regonix** ở 25°C. Nhiệt độ được phép từ 15 đến 30°C. Lưu trữ thuốc trong chai ban đầu và không bỏ chất hút ẩm. Giữ chặt chai sau khi mở lần đầu tiên. Hủy bỏ bất kỳ thuốc không sử dụng 7 tuần sau khi mở chai. Vứt bỏ những viên thuốc không sử dụng theo yêu cầu của địa phương theo hướng dẫn sử dụng

Bảo quản ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em

Xem thêm video giới thiệu về thuốc Regonix 40mg Regorafenib