

Завдання 32

Коли 11 місяців. Він важить 8 кг, довжина його тіла 69 см. Температура тіла 37°C . Мати повідомила, що у дитини сухий кашель уже 2 тижні.

У Колі немає загальних ознак небезпеки. Медичний працівник оцінив його кашель. Дитина кашляє вже 14 днів. Медичний працівник нарахував 41 дихання за хвилину. Медичний працівник не виявив втягнення грудної клітки. У дитини немає стридора у стані спокою. У дитини ні астмоїдного дихання.

- У Колі ні діареї.
- Він не мав лихоманки під час цього захворювання.
- Він не має проблеми з вухом.
- Він не має проблеми з горлом.

Медичний працівник перевіряє, чи є у Коли порушення харчування та анемія:

- У Колі ні низької маси тіла.
- Долоні у Колі дуже бліді, виглядають білими.

Медичний працівник визначив відповідність маси тіла Коли його віком, а також визначив показник МР/Д тіла.

Подивіться на графік відповідності маси тіла віку дитини та визначте, чи є його вага низький для віку. Подивіться на графік відповідності маси тіла дитини довжині її тіла та визначте показник МР/Д (нижче - 2 або 3 сигми)

Класифікуйте стан дитини.

Клінічний випадок 1 .

До лікаря звернулася мати з дівчинкою 3 років, маса тіла – 15 кг. Температура тіла під пахвою під час огляду 38,5°C, підвищена протягом 3 днів. Дівчинка скаржиться на біль у горлі, нежить, кашель. П'є та ковтає воду вільно . Блювоти не було, судом не було і немає під час огляду. Опитування виявило відсутність утрудненого дихання, втягнення грудної клітки, стридора та асмітного дихання. Болі у вусі та виділень з вуха немає. При фізикальному обстеженні лікар не виявив висипки на шкірі та слизових. Долоні не бліді. ЧДД – 19 за хвилину. Симптом ригідності потиличних м'язів негативний. При огляді ротоглотки нальоту на мигдаликах немає, передньошийні лімфовузли не збільшені та безболісні. Дитина щеплена за віком.

Класифікуйте стан дитини. Призначте лікування.

Клінічний випадок 2.

На прийом до амбулаторії мати принесла сина Олександра 5 місяців. Він важить 5,2 кг. Температура тіла в пахвій западині на момент огляду 37,5°C. Мати каже, що дитина відмовляється від їжі. Починає їсти та кидає груди з пронизливим криком. Вона каже, що він гарячий на дотик уже 2 дні. Лікар оглянув дитину. Хлопчик може пити, у нього не було блювоти, не було судом і немає на момент огляду, він не летаргічний і свідомий. Опитування виявило відсутність кашлю та діареї у дитини. Лікар перевінив наявність ригідності потиличних м'язів. - Цей симптом негативний. При огляді не виявлено висипки на тілі дитини, джерельця, що вибухає, гнійних виділень з вуха. Долоні хлопчика помірно бліді. Дитина щеплена за віком. Лікар запитав, чи отримує дитина вітамін Д. Мати відповіла ні.

Класифікуйте стан дитини. Призначте лікування.

Клінічний випадок 3 .

До лікаря звернулася мати з Майєю 5 років, маса тіла – 20 кг. Температура тіла під пахвою під час огляду 37,5 °С, підвищена протягом 2 днів. Дівчинка скаржиться на біль у горлі. Кашля та нежить не має. П'є та ковтає воду вільно. Блювоти не було, судом не було і немає під час огляду. Опитування виявило відсутність кашлю та утрудненого дихання, болю у вусі та виділень з вуха. При фізикальному обстеженні лікар не виявив висипки на шкірі та слизових, не відзначив втягнення грудної клітки, астмоїдного дихання або стридорозного дихання, долоні дуже бліді. ЧДД – 19 за хвилину. Симптом ригідності потиличних м'язів негативний. Під час огляду ротоглотки не виявлено нальоту на мигдаликах та болючості передньошийних лімфовузлів. Дитина щеплена за віком.

Класифікуйте стан дитини. Призначте лікування.