Выставка-предупреждение «Осторожно – СПИД!»

Книги плакаты и буклеты, представленные на выставке в библиотеке колледжа, расскажут о ВИЧ-инфекции, вызывающей заболевание СПИД *(синдром приобретенного иммунодефицита)*, о том, как можно обнаружить ВИЧ, каким образом происходит заражение этим вирусом, как проявляется заболевание, о мерах профилактики. На выставке также представят буклет «Твоя жизнь в твоих руках» и памятка «Последствия наркомании». В этот день всем желающим будет вручен буклет-памятка «СПИД – бояться не нужно – нужно знать».

HARVARD
ЗНАТЬ
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

Осторожно!
СПИД
Инновационные подходы
в профилактике ВИЧ-инфекции
1 декабря
Всемирный день
борьбы со СПИДом
ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Г. В. Трафимова
СПИД
ЧТО ТАКОЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?
СПИД – чума 21 века

Что необходимо знать о ВИЧ и СПИДе

ЗАЩИТИ СЕБЯ СЕГОДНЯ

Что такое ВИЧ и СПИД?

ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицта человека.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – конечная стадия течения ВИЧ-инфекции.

ВИЧ передается

Через кровь:

- ✓ при использовании общих и нестерильных шприцев для употреблении внутривенных наркотиков
- ✓ при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга, маникюра
- ✓ при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми остатками крови

Половым путем:

При незащищенном (без презерватива) проникающем половом контакте, даже если он единственный.

От матери к ребенку:

Во время беременности, родов, кормления ребенка грудным молоком ВИЧ-инфицированной женщины.

Своевременное обращение к врачу и лечение дает возможность ребенку родиться здоровым.

ВИЧ не передается

через:

- ✓ дверные ручки
- ✓ места общего пользования
- ✓ еду, посуду
- ✓ душ, баню, бассейн
- ✓ укусы кровососущих насекомых
- ✓ поцелуи и прикосновения

Только специальный анализ крови может показать, инфицирован человек или нет

Для достоверности тест на ВИЧ-инфекцию необходимо сделать не раньше, чем через 3 месяца после опасной в плане инфицирования ситуации, а при отрицательном результате повторить через 6 месяцев.