

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 04 по 10 жовтня 2024 року.

Озима пшениця – сівба, сходи. Озимий ячмінь – сівба. Соняшник – повна стиглість. Озимий ріпак – сходи, утворення листової розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці злаковими блішками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 35 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин, личинками хлібної жужелиці за середньої чисельності – 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин озимої пшениці. Відмічається літ злакових мух: гессенської мухи – 2 екз. на 100 п.с., шведських мух – 1 екз. на 100 п.с., пшеничної мухи – 1 екз. на 100 п.с., цикадок в середньому нараховується 5 екз. на 100 п.с. на 33 % обстежених площ (637 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 20 % рослин на 29 % обстеженої площі, гусеницями капустяного білана за середньої чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 71 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 57 % обстежених площ, гусеницями капустяна совка за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 14 % обстежених площ, гусеницями капустяної молі за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 14 % обстежених площ, капустяною попелицею за середньої чисельності 5 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 71 % обстежених площ, білокрилкою за середньої чисельності 4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 13 % рослин на 71 % обстежених площ. Альтернативіозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 18 % обстежених площ (176 га).

В посівах цукрових буряків гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 4 % обстежених площ. Фомозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстежених площ, церкоспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстежених площ (214 га).

В посівах соняшнику білою гниллю уражено 67 % рослин (прикоренева форма - 35 %, стеблова форма - 25 %, кошик – 40 %) з розвитком хвороби 5 % на 27 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 10 % рослин (прикоренева форма - 30 %, стеблова форма - 30 %, кошик – 40 %) з розвитком хвороби 7 % на 39 % обстежених площ (162 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 2 на 35 % обстеженої площі 637 га. На площах

озимого ячменю (134 га) мишоподібних гризунів не виявлено. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1,5, нір на колонію 5 на 55 % обстеженої площі 600 га, на площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 4 на 71 % обстеженої площі 375 га, на площах з-під зернових середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 2 на 71 % обстеженої площі 140 га, на неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 7 на 25 % обстеженої площі 4 га.