

ORIENTAÇÕES TCE

Até o momento não pudemos constatar, através dos exames realizados, qualquer evidência de que o traumatismo craniano deste paciente tenha sido significativo para que ele permaneça em observação ou admitido nesta unidade, portanto será LIBERADO. Entretanto, novos sintomas, sinais e complicações inesperadas podem ocorrer horas, dias, semanas ou até meses após o traumatismo. As primeiras 48 horas são as mais importantes. É aconselhável que este paciente permaneça em companhia de alguém confiável pelo menos durante este período. O paciente deve procurar atendimento em hospital especializado imediatamente, se aparecerem sintomas ou sinais abaixo relacionados:

- Dor de cabeça, Sonolência excessiva ou insônia.
- Irritabilidade, ansiedade ou labilidade emocional.
- Desmaio, fraqueza, diminuição da força nas pernas, metade do corpo ou formigamento, adormecimento no corpo.
- Dificuldade de falar ou entender, de memória, ou para se concentrar.
- Alteração de personalidade ou de comportamento.
- Confusão mental ou piora progressiva da consciência.
- Náuseas, vômitos, tonturas ou convulsão.
- Diminuição da audição, da visão ou intolerância à luz.
- Movimento estranho dos olhos, visão dupla.
- Alteração da respiração das batidas do coração, febre (temperatura > 37,8 oC).
- Perda de líquido ou sangue pelo ouvido ou nariz.
- Tamanhos ou formas das pupilas dos olhos diferentes.
- Quadro depressivo ou de agressividade.
- Dor na nuca ou durante movimentos do pescoço.
- Dificuldades para realizar suas atividades domésticas ou no emprego.

O paciente pode continuar usando somente as medicações prescritas por seu MÉDICO, porém, não use sedativos ou remédios para dormir, xarope para tosse, ou outras que possam produzir sono ou bebidas alcoólicas, ao menos durante 48 horas. Durante o sono, peça para ser acordado frequentemente, para que se possa avaliar a presença das orientações acima.