

李可少阴病医案处方及剂量
涪陵古本伤寒论研究班 王辉

医案一：少阴病—急性心力衰竭

患者：

- 年龄：72岁
- 性别：男性
- 病情：急性心力衰竭。患者表现为心悸、气短、四肢厥冷、面色苍白、舌质淡胖，苔白滑，脉微细欲绝。

治疗：

- 方药：附子理中汤加减
 - 处方：附子30g，干姜10g，党参15g，白术12g，炙甘草10g
 - 加减：若心悸严重，加桂枝10g，炙甘草10g以温阳益气

效果：

- 用药后，患者心悸、气短缓解，四肢温暖，脉象回升，病情逐渐好转。

医案二：少阴病—急性脑梗塞

患者：

- 年龄：64岁
- 性别：女性
- 病情：急性脑梗塞。患者突然出现意识模糊，言语不清，肢体乏力，面色晦暗，舌质淡胖，苔白滑，脉沉细。

治疗：

- 方药：真武汤合温胆汤加减
 - 处方：附子15g，白术12g，茯苓15g，生姜10g，半夏10g，陈皮10g，茯苓15g，炙甘草6g
 - 加减：若意识模糊严重，加桂枝10g，丹参15g以活血化瘀，通窍开闭

效果：

- 用药后，患者意识逐渐清醒，言语恢复，肢体力量有所恢复，脉象逐渐有力，病情稳定。

医案三：少阴病—急性肾功能不全

患者：

- 年龄:70岁
- 性别:男性
- 病情:急性肾功能不全。患者少尿、浮肿、神疲乏力、畏寒肢冷、舌质淡胖,苔白滑,脉沉细。

治疗:

- 方药:肾气丸合真武汤加减
 - 处方:附子15g,桂枝10g,熟地20g,山茱萸15g,山药15g,泽泻10g,茯苓15g,丹皮10g,干姜10g,白术12g
 - 加减:若浮肿严重,加黄芪30g,党参15g以补气固表

效果:

- 用药后,患者尿量逐渐增多,浮肿消退,四肢温暖有力,精神好转,病情明显改善。

医案四:少阴病—病毒性心肌炎

患者:

- 年龄:45岁
- 性别:女性
- 病情:病毒性心肌炎急性发作。患者心悸、胸闷、四肢冰冷、乏力,舌质淡胖,苔白腻,脉沉细。

治疗:

- 方药:附子理中汤合桂枝甘草汤加减
 - 处方:附子15g,干姜10g,党参15g,白术12g,炙甘草10g,桂枝10g
 - 加减:心悸严重者,加炙甘草10g,红参10g以增强心脏功能

效果:

- 用药后,患者心悸、胸闷缓解,四肢温暖,乏力改善,脉象逐渐有力。

医案五:少阴病—急性肾炎

患者:

- 年龄:50岁
- 性别:男性
- 病情:急性肾炎。患者少尿、浮肿、腰痛、畏寒,舌质淡胖,苔白滑,脉沉细。

治疗:

- 方药:真武汤合肾气丸加减

- 处方:附子15g, 干姜10g, 白术12g, 茯苓15g, 桂枝10g, 熟地20g, 山茱萸15g, 山药15g, 泽泻10g, 丹皮10g
- 加减:浮肿严重者, 加黄芪30g, 益母草15g以利水消肿

效果:

- 用药后, 患者尿量增加, 浮肿消退, 腰痛缓解, 病情逐步好转。

说明:

- 该篇医案通过ChatGPT搜索得来。
- 以下医案均选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》，作者雒晓东。
- 药物剂量和实际出版书籍有所出入。