

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 25 травня 2023 року.

На обстеженій площі озимої пшениці 1562 га клопом-черепашкою заселено 554 га (35 %) в середній чисельності – 0,8, максимально – 2 екз. на кв.м. В середньому пошкоджено – 2, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені. Самок в середньому – 72 %, в т.ч. зрілі – 30 %, дозріваючі – 40 %, незрілі – 30 %.

Імаго хлібних п'явиць в середній чисельності – 0,7, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 2 % рослин в слабкому ступені, заселено 33 % від обстеженої площі озимої пшениці 1562 га. В Кропивницькому районі (Олександрівський район) яйцекладками шкідника в середній чисельності – 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % рослин на 73 га озимої пшениці з 136 га обстежених.

У посівах озимої пшениці спостерігався літ злакових мух: середня чисельність шведських мух – 9, максимально – 18 екз. на 100 п.с. на 30 % обстежених площ, середня чисельність гессенської мухи – 19, максимально – 28 екз. на 100 п.с. на 30 % обстежених площ, середня чисельність пшеничної мухи – 14, максимально – 23 екз. на 100 п.с. на 30 % від обстежених площ озимої пшениці 1562 га. У посівах озимого ячменю відмічався літ злакових мух: середня чисельність шведських мух – 1 екз. на 100 п.с., середня чисельність гессенської мухи – 5 екз. на 100 п.с., середня чисельність пшеничної мухи – 3 екз. на 100 п.с. на 32 % від обстежених площ 499 га.

У посівах озимої пшениці спостерігався літ цикадок в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. на 31 % від обстежених площ 1562 га.

В посівах озимої пшениці злаковими попелицями в середній чисельності – 5, максимально – 12 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 4, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені на 66 % від обстеженої площі 1562 га.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 5, максимально – 14 % рослин в слабкому ступені на 41 % від обстеженої площі 1562 га.

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) закінчило живлення в середньому – 85, максимально – 100 % личинок хлібної жужелиці, залялькувалось 60 % шкідника.

Під час виходу в трубку за наявності 2-4 екз. на кв.м клопа шкідлива черепашка слід проводити захисні обробки рекомендованими препаратами згідно з Переліком. Ці обробки будуть ефективними й проти інших вищезазначених шкідників в посівах зернових колосових культур.

Борошнистою россою в середньому уражено – 4, максимально – 8 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 4 % на 44 га з 1562 га обстежених. Бурою іржею в середньому уражено – 5, максимально – 15 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 6 % на 476 га з 1562 га обстежених. Септоріозом в середньому уражено – 4, максимально – 10 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 2,

максимально – 4 % на 1305 га з 1562 га обстежених.

Борошнистою россою уражено 2 % рослин озимого ячменю з розвитком хвороби 1 % на 264 га з 499 га обстежених. Бурою іржею уражено 2 % рослин озимого ячменю з розвитком хвороби 1 % на 190 га з 499 га обстежених. Септоріозом уражено 2 % рослин озимого ячменю з розвитком хвороби 1 % на 160 га з 499 га обстежених.

На посівах, де дотримуються технології вирощування культур і своєчасно провели боронування, підживлення та оздоровлення рослин, не відмічається перезараження та поширення хвороб. Під час виходу рослин в трубку, за інтенсивності ураження борошнистою россою, бурою листовою іржею, гельмінтоспоріозом, іншими плямистостями 1 %, септоріозом листя 3-5 %, кореневими гнилями за достатнього зволоження – обприскують рекомендованими фунгіцидами відповідного спектру дії.

В посівах кукурудзи злаковими блішками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин в слабкому ступені на 42 га з 116 га обстежених. В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені на 42 га від обстеженої площі 116 га. Піщаним мідяком за середньої чисельності 1 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин кукурудзи на 74 га від обстеженої площі 116 га.

В Кропивницькому районі (Долинський район) в посівах гороху гороховою попелицею в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с в середньому пошкоджено 1 % рослин (116 га).

В Кропивницькому районі (Олександрівський район) піщаним мідяком за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин гороху (67 га).

Буряковим довгоноси́ком за середньої чисельності – 0,8, максимально – 2 екз. на кв.м пошкоджено 3 % рослин цукрових буряків (178 га).

В посівах соняшнику піщаним мідяком в середній чисельності – 1,3, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 5, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені на 448 га з 612 га обстежених. Дротяниками в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин соняшнику в сильному ступені на 68 га з 612 га обстежених.

В Кропивницькому районі (Долинський район) буряковою попелицею в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 1 % рослин соняшнику на 47 га з 143 га обстежених.

Ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 1 екз. на рослину пошкоджено 2 % рослин озимого ріпаку на 294 га з 575 га обстежених.

Оленкою волохатою за середній чисельності – 1,6, максимально – 2 екз. на рослину пошкоджено – 4, максимально – 10 % рослин озимого ріпаку на 391 га з 575 га обстежених.

Хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 320 га з 575 га обстежених.

Личинками ріпакового стеблового прихованохоботника в середній чисельності – 2, максимально – 4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено – 5, максимально – 10 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 396 га з 575 га обстежених.

В Кропивницькому районі (Долинський район) капустяним стручковим комариком (галицею) в середній чисельності 4 екз. на стручок в середньому пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку (70 га).

В Кропивницькому районі (Олександрівський район) імаго ріпакового насінневого прихованохоботника в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин озимого ріпаку (294 га) в слабкому ступені.

Альтернаріозом уражено 12 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 10 % на 76 га з 575 га обстежених. Пероноспорозом уражено 2 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 170 га з 575 га обстежених. Фомозом уражено 10 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 5 % на 150 га з 575 га обстежених.

Стан посівів ріпаку покращують агротехнічними заходами (розпушування міжрядь, боронування, підживлення азотними добривами). За появи хвороб проводять оздоровлення фунгіцидами згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі – Державний реєстр). Осередки заселення хрестоцвітими блішками (ЕПШ 3-5 екз. на кв.м), листкоїдами (ЕПШ 3 екз. на кв.м), прихованохоботниками (ЕПШ 5-6 жуків на рослину) захищають через обробки рекомендованими інсектицидами.

Імаго колорадського жука за середньої чисельності – 2, максимально – 5 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено – 30, максимально – 40 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено – 10, максимально – 15 % кущів (присадибні ділянки).

Імаго колорадського жука за середньої чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 10 % рослин томатів, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 4 % рослин (присадибні ділянки).

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) в плодкових садах яблуневою міллю в середній чисельності 1 гніздо на дерево в середньому пошкоджено 2 % листків в слабкому ступені – 75, середньому – 22, сильному – 3 % на 10 % дерев (4 га).

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) з 20 травня відмічено початок льоту яблуневої плодожерки, в середньому – 0,7, максимально – 1 екз. за добу.

Яблуневими попелицями в середній чисельності – 20, максимально – 35 екз. на заселений лист в середньому заселено та пошкоджено – 11, максимально – 15 % листків в середньому на – 17, максимально – 30 % дерев (присадибні ділянки та 1 га саду).

Сірим бруньковим довгоносигом в середній чисельності 2 екз. на дерево пошкоджено – 2, максимально – 4 % листя на 30 % дерев (1 га саду).

Борошнистою росю уражено – 8, максимально – 20 % листків з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 10 % в середньому – на 25, максимально – 30 % дерев (присадибні ділянки та 1 га саду).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.