

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 06 жовтня 2022 року.

В Петрівському (Олександрійський) районі відмічається літ злакових мух: шведських мух в середньому нараховується 1 екз. на 100 п.с., гессенської мухи – в середньому 1 екз. на 100 п.с., пшеничної мухи – в середньому 1 екз. на 100 п.с. на 200 га обстежених площ, цикадок – 4 екз на 100 п.с. на 110 га обстежених площ озимої пшениці. Гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин озимої пшениці (200 га) в сильному ступені. В посівах озимої пшениці (200 га) личинками хлібної жужелиці в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин.

Проти личинок хлібної жужелиці обробки посівів озимих зернових після колосових попередників проводять у фазі сходи-3-й листок за чисельності 1-2 екз. на кв.м, на початку куціння – 2-3 екз. на кв.м і більше інсектицидами згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, підготовленого за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2022 році (далі – Перелік).

В Гайворонському (Голованівський) районі в посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 8 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 60 га з 215 га обстежених. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 100 %) на 60 га кукурудзи з 215 га обстежених.

Фузаріозом уражено 1 % качанів кукурудзи (200га).

Білою гниллю в середньому уражено – 8, максимально – 9 % рослин соняшнику (в прикореневій – 35 %, стебловій – 25 %, кошиковій формі – 40 %) з середнім розвитком на кошиках – 5, максимально – 6 % на 85 га з 278 га обстежених.

Сірою гниллю в середньому уражено – 7, максимально – 13 % рослин соняшнику (в прикореневій – 16 %, стебловій – 16 %, кошиковій формі – 68 %) з середнім розвитком на кошиках – 5, максимально – 6 % на 120 га з 880 га обстежених.

Хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 12 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 96 га з 531 га обстежених. Гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 95 га з 531 га обстежених.

В Знам'янському (Кропивницький) районі гусеницями капустяної молі в

середній чисельності – 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 65 га обстежених площ.

В Гайворонському (Голованівський) районі капустяною попелицею в середній чисельності 0,2 екз. на рослину заселено і пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 180 га обстежених площ.

Ріпаківим пильщиком в середній чисельності 1 екз. на рослину заселено і пошкоджено 5 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 370 га з 531 га обстежених.

В Бобриницькому (Кропивницький) альтернаріозом в середньому уражено 2 % рослин озимого ріпаку з середнім розвитком хвороби 1 % на 96 га обстежених площ.

У фази 2-4 листки-утворення розетки озимого ріпаку проти ріпаківих пильщика і листкоїда (3 екз.), капустяних білана і совки (2 гусениці на кв.м), хрестоцвіті клопи, ін. та проти борошнистої роси, альтернаріозу, сірої гнилі, септоріозу, ін. (за появи ознак хвороби) проводять обприскування пестицидами, дозволеними до використання Переліком.

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1 на га, в середньому 2 нори на колонію на 95 га з 531 га обстежених. На площах 3-під соняшнику (208 га) середня чисельність колоній шкідника – 1,3, максимально – 3 на га, в середньому – 3, максимально – 7 нір на колонію. На неорних площах (7 га) середня чисельність колоній шкідника – 2, максимально – 5 на га, в середньому – 7, максимально – 10 нір на колонію.

З метою запобігання збільшення чисельності та шкідливості мишоподібних гризунів слід проводити постійний моніторинг їх розвитку та профілактичні заходи щодо зменшення чисельності шкідників: глибока оранка полів, знищення гризунів у місцях резервацій з метою недопущення розселення їх у посіви озимих сільськогосподарських культур. За наявності 3-5 і більше жилих колоній на гектарі необхідно застосовувати родентициди, дозволені до використання Переліком. З метою охорони навколишнього середовища перевагу надавати біологічному методу боротьби.

З перевірених партій зерна при обстеженні 0,09 тис. тонн зерна озимої пшениці, 0,01 тис. тонн зерна соняшнику, 0,06 тис. тонн озимого ріпаку шкідників запасів не виявлено.