

На виконання розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року № 454-р «Про проведення в області комплексу весняно-польових робіт у 2025 році» управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 04 по 10 квітня 2025 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – кущення. Ячмінь – сходи. Озимий ріпак – 6-8 листків. Горох – сходи.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,6 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 20 % обстежених площ, злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ, злаковими п'явицями в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 4 % обстеженої площі. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: шведські мухи – в середньому 7 екз. на 100 п.с. на 37 % від обстежених площ, пшенична муха – 4 екз. на 100 п.с. на 35 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 5 екз. на 100 п.с. на 14 % обстежених площ. Борошнистою росю уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 19 % обстежених площ, бурю іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 23 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 27 % обстежених площ, піренофорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 6 % обстежених площ (2956 га).

В посівах ячменю злаковими цикадами в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. на 100 % обстежених площ (60 га).

В посівах озимого ячменю гельмінтоспоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 13 % обстежених площ (158 га).

В посівах озимого ріпаку капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 1,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 45 % обстежених площ, альтернаріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 48 % обстежених площ (560 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,3, нір на колонію – 3 на 23 % від обстежених площ 2956 га. На обстежених площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 8 на 38 % від обстеженої площі 139 га. На обстежених площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 3 на 4 % від обстеженої площі 423 га. На обстежених неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 1 на 96 % від обстеженої площі 67 га. На площах з-під соняшнику (287 га) та гороху (246 га) мишоподібних гризунів не виявлено.