

Savisanger

Opdateret 6/6 2018 LB

Af Lasse Braae

Her primo april er det endnu ikke blevet rigtig forår, men det kribler for at komme ud, så valget i denne udgave er faldet på tre forholdsvis nemme arter.

Observationer angivet med *kursiv* i nedenstående forefindes ikke i DOF-basen.

Savisangern er en af de mange arter, der startede indvandringen fra syd og sydøst længe inden nogen begyndte at snakke om klimæændringer, men som det fremgår af status i oversigterne, er denne udvikling gået i stå og i flere områder er den stadig en meget sjælden fugl.

Salomonsen (1963) angiver blot 1 fund i appendix II (arter som med urette er angivet som forekommende i Danmark).

I Dybbro (1978) status ændret til meget sjælden, måske uregelmæssig yngletrækfugl (ult apr/maj – aug). Der angives to formodede ynglefund det ene fra Vestsjælland. Dette er siden blevet forkastet.

Formodes at yngle årligt i Sønderjylland.

Sjælden, men regelmæssig, pletvis forekommende træk- og sommergæst i ovennævnte periode.

Status i den seneste oversigt (Olsen 1992) må anses også at gælde i dag: Meget sjælden – sjælden træk- og sommergæst (med apr/maj – aug) og muligvis meget sjælden yngletrækfugl.

Ynglebestand angives til 1 – 10 par i 1980'erne formodentlig regelmæssig ynglefugl i Sønderjylland, på Langeland og i Vejlerne.

Første fund angives til 29/5 1949 Tinglev Mose, Sønderjylland. Fra 1964 og til midt i 1970'erne stigende antal, flest 1971 – 73 (25 – 30 årligt), men herefter tilbagegang, og fra sidst i 1970'erne stagnerende antal (10 – 20 årligt). Uregelmæssig uden for de faste lokaliteter, der også inkluderer Porsemosen og Busemarke, Møn.

Arten var på SU-listen indtil 1971. I alt blev der godkendt ca.41 fund, blot et af disse er fra Vestsjælland:

1 17/5 28/5 1970 1 Borreby Mose (*J. Christensen*)

Gennemgang af årsrapporterne har ikke givet det store afkast. For at få en fuldstændig oversigt skal man derfor helt ned og grave i det egentlige rapportarkiv.

Kun disse er nævnt i årsrapporterne:

4 27/5 1981 1 Trelleborg

5 15/5 1982 1 Hallebyå ved Ornum
 6 21/5 – 22/5 1 1982 Bregninge Mose
 7 11/6 1983 1 Flyndersø, Rørvig
 8 26/6 1983 1 Hanebjerg Mose
 7/5 – 9/7 1985 5 fugle på Sjælland – mindst 1 fra Vestsjælland:
 9 6/9 1985 1 Stigsnæs Havn
 6/5 – 25/7 1987 5 fugle på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 1990 3 fugle på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 1991 0 på Sjælland.
 1992 6 fugle på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 11 30/5 – 9/6 1993 1 syng Hovvig
 1995 33 – 44 fugle i Danmark, heraf 6 på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 1996 27 – 28 fugle i Danmark, heraf 3 på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 1997 Kun 11 fugle i Danmark – ingen fra Vestsjælland.
 1998 Kun 9 fugle i Danmark -
 14 7/6 1998 1 Tystrup/Bavelse var 1 af 3 på Sjælland.
 15 25/4 2000 1 Hovvig
 17 24/6 2000 1 Borreby Mose
 2003 5 fugle på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 2005 17 fugle i Danmark, heraf 2 på Sjælland – nogen fra Vestsjælland?
 2006 22 fugle i Danmark, heraf 3 på Sjælland – mindst 1 fra Vestsjælland:
 19 25/4 – 9/5 1 Borreby Mose
 22 – 24 22/5 – 12/7 2007 1 – 3 Kongemosen

Fra Rørvigområdet foreligger følgende fund:

2 8/5 1973 1 syng Korshage
 3 18/5 1975 1 syng Korshage
 7 4/6 – 11/6 1983 1 syng Flyndersø (3 observationsdage)
 10 5/6 – 6/6 1992 1 syng Hovvig
 11 30/5 – 9/6 1993 1 syng Hovvig (8 observationsdage)
 12 29/5 1995 1 syng Korshage
 13 4/6 1998 1 syng Hovvig
 15 21/4 – 25/4 2000 1 syng Hovvig
 16 14/5 2000 1 syng Hovvig

Opstillet pr 5 årsperiode ses tydeligt, at det var i 70'erne og 90'erne det skete her:

1973 - 77	1978 - 82	1983 - 87	1988 - 92	1993 - 97	1998 - 02	2003 - 07	2008 - 12	I alt
2	0	1	1	2	3	0	0	9

I DOFbasen er der 56 registreringer fra Vestsjælland.

Den ældste er 1993 fundet fra Hovvig. Nye i forhold til ovenstående er:

13 20/7 1995 1 Madesø

16 13/5 2000 1 Klint Sø
 18 9/5 2005 1 Borreby Mose
 20 7/5 2006 1 Kongemosen
 21 8/5 – 9/5 2006 1 Borreby Mose
 25 1/7 2009 1 Borreby Mose
 26 27/6 – 29/6 2010 1 Torpet Mose
 27 29/6 – 3/7 2010 1 Borreby Mose
 28 13/6 2011 1 Lille Åmose vest
 29 9/7 2011 1 Kalundborg by

Dermed mindst 29 fund fra Vestsjælland – men som sagt, der mangler nok en par stykker hist og pist.

Af kortet ses, at det er yderst få lokaliteter, der kan bryste sig med denne art:



Fordeling af de 29 fund pr 5-årsperiode:

1968 - 72	1973 - 77	1978 - 82	1983 - 87	1988 - 92	1993 - 97	1998 - 02	2003 - 07	2008 - 12
1	2	3	3	1	2	5	7	5

Umiddelbart tyder tabellen på, at Savisangeren har været mest hyppig i de sidste 15 år. Forklaringen er antagelig, at der mangler en hel del observationer fra tidligere år. I resten af landet er arten betydelig mere almindelig i de sydlige dele af landet – dette gælder givetvis også for Vestsjælland ikke bare for de sidste 15 år, men alle år.

Savisangeren forekommer udelukkende i rørskov, så bortset fra de udprægede træksteder, hvor arten kan dukke op i hvilken som helst busk, så er udbuddet af lokaliteter begrænset. Savisangeren er desuden en udpræget natsanger – så opskriften på at finde en må være

natlyt ved passende lokaliteter. Chancerne er givetvis størst i den sydlige del af området. Vælg nogle passende lokaliteter og tag ud og tæl Græshoppesangerne. Stille aftner er bedst. Savisangeren synger fra sidst i april og helt i juli – så der er mange muligheder for en god natlyt med en sidegevinst – god fornøjelse.

Litteratur

Dybbro, Tommy 1976: De danske ynglefugles udbredelse.
Olsen, Klaus Malling 1992: Danmarks fugle – en oversigt.
Salomonsen, Finn 1963: Oversigt over Danmarks Fugle.
Fugleåret 2006 – 2011.
Rapportgruppens årsrapport 1974 – 2005.
SU rapporter 1969 – 1996.