

ПОГОДЖЕНО
Голова профкому _____ М.М. Мазуряк

ступенів

ГАКМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом №106 від 16.08.2021р.
та введено в дію 01.09.2021
Директор Іспаського ЗЗСО І-ІІІ

імені Миколи Марфієвича
_____ Віталій

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час роботи із дезінфекційними засобами з метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці під час роботи із дезінфекційними засобами з метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19 (далі — Інструкція) передбачає проведення заходів для запобігання небезпеки, пов'язаної з особливостями цього виду роботи у відповідному структурному підрозділі, та встановлює вимоги до працівників, які працюють із дезінфекційними засобами.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 [№ 526](#)); Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Хімічні дезінфекційні засоби — це речовини, які застосовують для приготування дезінфекційних розчинів для оброблення різних предметів, щоб знищити збудники інфекційних хвороб у середовищі життєдіяльності людини.

Дезінфекційні засоби — небезпечні та отруйні речовини, які під час контакту зі шкірою, очима, органами дихання чи травлення можуть спричиняти опіки, отруєння, інші ушкодження і травми, тому під час їх використання слід дотримувати вимог безпеки.

1.4. Під час роботи застосовують дезінфекційні засоби, дозволені МОЗ.

1.5. Працівники, які працюють із дезінфекційними засобами, зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- знати властивості дезінфекційних засобів та їх дію на організм людини;
- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;
- пройти інструктаж відповідно до інструкції з надання першої долікарської допомоги та мати навички надання такої допомоги потерпілому залежно від отриманої травми, отруєння тощо;
- пройти інструктаж із пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні засоби пожежогашіння, вміти ними користуватися;
- дотримувати правил особистої гігієни, приймати їжу у передбачених для цього місцях, утримувати в порядку робоче місце.

1.6. Працівників допускають до роботи після вступного, первинного інструктажів на робочому місці, перевірки знань з охорони праці. Повторний інструктаж проводять раз на три місяці.

Позаплановий інструктаж проводять під час введення в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці та у випадку внесення змін та доповнень до них; під час зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають на стан охорони праці; за порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; під час перерв у роботі працівника більш ніж на 30 календарних днів.

Результати інструктажів вносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, де ставлять свої підписи особа, яка провела інструктаж, та особа, яка пройшла інструктаж.

1.7. До роботи з дезінфекційними засобами допускають осіб, які пройшли у встановленому порядку попередні та періодичні обов'язкові медичні огляди.

1.8. До роботи з дезінфекційними засобами не допускають осіб віком до 18 років, вагітних, жінок-годувальниць, осіб, які мають медичні протипоказання або не пройшли відповідний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки.

1.9. Не допускають до роботи осіб, які порушили вимоги правил, норм та інструкцій з охорони праці (пожежної безпеки, виробничої санітарії).

1.10. Заборонено виконувати роботу на несправному обладнанні.

1.11. Усі роботи, пов'язані із дезінфекційними засобами (фасування, приготування розчинів тощо), проводять у спецодязі (халат, косинка),

обов'язково використовують засоби індивідуального захисту (гумові рукавички).

1.12. До роботи із дезінфекційними засобами не допускають осіб, які не мають засобів індивідуального захисту.

1.13. Усі роботи, пов'язані з приготуванням дезінфекційних розчинів проводять у спеціально обладнаному, добре провітрюваному приміщенні, забезпеченому проточною питною водою, каналізацією, аптечкою першої медичної допомоги.

Утилізують дезінфекційні засоби, робочі розчини методом згідно з регламентом чи методичними вказівками для такого дезінфекційного засобу.

1.14. Запаси дезінфекційних засобів зберігають у місцях, не доступних для загального користування, у сухому прохолодному приміщенні.

1.15. Усі дезінфекційні засоби і розчини мають бути з етикетками, на яких зазначають назву, концентрацію, дату виготовлення і строк придатності.

1.16. У відділеннях дезінфекційні засоби і їх розчини зберігають окремо від фармпрепаратів у місцях, не доступних для дітей та осіб, які не займаються дезінфекцією.

1.17. Зберігають розчини і витримують у них предмети, що підлягають обробленню, у щільно закритих ємкостях.

1.18. Не можна працювати із дезінфекційними засобами, які не мають сертифікатів (інструкцій, регламентів, методичних вказівок тощо), без зазначеної назви, дати виготовлення, строку придатності тощо.

1.19. Заборонено вживати їжу, курити під час робіт із дезінфекції чи приготування дезінфекційних розчинів.

У приміщенні, де готують дезінфекційні розчини, заборонено зберігати харчові продукти.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи із дезінфекційними розчинами працівники зобов'язані:

- перевірити справність спеціального одягу, інших засобів індивідуального захисту і лише потім надягти їх;
- упевнитися, що взяли необхідні для роботи дезінфекційні розчини, перевірити дати їх виготовлення та строки використання.

2.2. Про виявлені порушення, несправності обладнання та засобів захисту повідомити безпосереднього керівника та не починати роботу, поки їх не усунуть.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час застосування дезінфекційних розчинів:

- використовувати засоби індивідуального захисту та працювати у спеціальному одязі;
- запобігати розбризкуванню чи потраплянню в очі та на шкіру.

3.2. У випадку виявлення несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах захисту слід негайно зупинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про це безпосереднього керівника та не продовжувати роботу без його вказівки.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, які використовували, прибрати їх у спеціально відведене місце.

4.2. Не можна зберігати чистий (домашній) одяг разом зі спецодягом в одній шафі.

4.3. Після дезінфекційних робіт необхідно провітрити приміщення, де їх проводили, упродовж не менше 15 хв.

4.4. Вимити руки з милом теплою водою з мийним засобом, за потреби вмити водою обличчя та промити відкриті ділянки тіла, на які могли потрапити бризки розчинів, прополоскати рот водою, за можливості обробити руки засобом для пом'якшення шкіри.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі надзвичайної ситуації (нещасного випадку, аварії, пожежі) негайно припинити роботу.

5.2. Повідомити безпосереднього керівника та надалі керуватися його вказівками.

5.3. У разі проливання легкозаймистих рідин необхідно вимкнути електроживлення, розливу речовину засипати піском, який потім зібрати дерев'яною лопаткою і винести у безпечне місце. У випадку проливання кислоти або лугу на підлогу після того, як засипали піском, їх треба нейтралізувати (кислоту — негашеним вапном або кальцинованою содою, луги — розчином оцтової кислоти). Підлогу слід вмити водою і насухо витерти.

5.4. У випадку іскріння (спалахування) струмоведучих частин від'єднати електрообладнання від мережі живлення та негайно повідомити безпосереднього керівника, електрика.

5.5. Під час загоряння (пожежі) слід від'єднати електрообладнання від мережі живлення, закрити вентилі на лініях подачі води, газу тощо, повідомити ДСНС про пожежу за телефоном 101; негайно розпочати гасити

осередок пожежі наявними засобами пожежогасіння до прибуття працівників ДСНС.

6. Заходи першої допомоги за отруєння дезінфекційними засобами

6.1. У випадку ознак отруєння (запаморочення, утруднене дихання, нудота, біль у голові, слинотеча, слезотеча, звуження зіниць, мимовільне скорочення м'язів) потрібно вийти на свіже повітря, прополоскати рот і носоглотку водою або 2%-вим водно-содовим розчином (чайна ложка питної соди на склянку води).

6.2. У випадку потрапляння дезінфекційного розчину в очі — довго промивати їх струменем води. Якщо є подразнення слизових оболонок очей, закапати 1-2 краплі 30%-вого сульфацилу натрію.

6.3. У випадку потрапляння дезінфекційних засобів на шкіру — промити уражену ділянку великою кількістю проточної води.

6.4. У випадку потрапляння дезінфекційних засобів у шлунок — випити кілька склянок води із 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля. Не викликати блювання!

6.5. У разі потрапляння кислоти на шкіру або в очі — негайно змити її під сильним струменем води протягом 10-15 хв, а потім промити розчином питної соди (чайна ложка на склянку води).

6.6. У випадку потрапляння на шкіру лугу — негайно змити його під сильним струменем води протягом 10-15 хв, а потім обробити місце опіку 3-6%-вим розчином оцтової або борної кислоти (чайна ложка на склянку води), а за уражень очей лугом — обробити очі 2%-вим розчином борної кислоти.

6.7. У важких випадках можливі судоми і втрата свідомості. Хворого кладуть так, щоб голова була нижче за тулуб (це забезпечить доступ свіжого повітря та притік крові до голови). Аби збільшити приплив крові до голови за непритомного стану, пацієнта можна покласти так: поки пацієнт лежить на спині, зігнути його праву ногу і притягнути до стегна; праву руку покласти за спину; повернути пацієнта на правий бік (права рука позаду); ліву руку зігнути, долоню покласти під щоку. Звільнити пацієнта від тісного одягу. Забезпечити доступ свіжого повітря (перевірити прохідність дихальних шляхів). Можна злегка змочити обличчя холодною водою. Дати пацієнту вдихнути пари нашатирного спирту на ватній кульці; протерти скроні ватною кулькою з нашатирним спиртом. Не можна робити холодні компреси або давати хворому пити воду. Через порушену здатність ковтати вода може

потрапити в дихальні шляхи. У разі зупинки серця необхідно проводити непрямий масаж серця в поєднанні зі штучним диханням.

6.8. У всіх випадках слід звернутися по спеціалізовану допомогу та повідомити безпосереднього керівника.

Розробила:

Заступник директора з НВР

А.В. Щербань

Ознайомлен _____:

(підпис)

(П.І.Б.)

Дата _____