

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 10 по 16 червня 2022 року.

Озимі пшениця, ячмінь – цвітіння-молочна стиглість. Ярий ячмінь – колосіння. Озимий ріпак – дозрівання. Горох – цвітіння, утворення бобів. Кукурудза, цукрові буряки – листоутворення. Соя, соняшник – листоутворення. Картопля – цвітіння. Сад – формування плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 68 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 0,5 екз. на кв.м на 61 % обстежених площ, личинками шкідника за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 81 % обстежених площ; личинками хлібних п'явиць за середньої чисельності 1,3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 64 % обстежених площ; злаковими попелицями за середньої чисельності 5 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 6 % рослин на 78 % обстежених площ; злаковими трипсами в середній чисельності 4 екз. на колос заселено 6 % рослин на 61 % обстежених площ; імаго хлібних жуків в середній чисельності 1,4 екз. на кв.м заселено 40 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 36 % обстежених площ, бурю іржею уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 56 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 85 % обстежених площ (949 га).

В посівах озимого ячменю личинками хлібними п'явицями за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 100 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 100 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (150 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 6 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 5 % рослин на 65 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 4 екз. на кв.м пошкоджено 4 % рослин на 68 % обстежених площ (651 га).

В посівах гороху бульбочковими довгоносіками за середньої чисельності 7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 100 % обстежених площ, на 100 п.с. в середньому нараховується 90 екз., горохової попелиці та 6 екз. горохового зерноїду. Аскохітозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 100 % обстежених площ (60 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносіками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ.

Септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 10 % обстежених площ (212 га).

В посівах соняшнику гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 9 % рослин на 5 % обстежених площ, буряковою попелицею за середньої чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 21 % обстежених площ. Септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 18 % від обстежених площ, пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 36 % обстежених площ, фомоз уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 39 % обстежених площ (651 га).

В посівах озимого ріпаку личинками стручкового капустиного комарика (галицею) в середній чисельності 8 екз. на стручок заселено та пошкоджено 22 % рослин та 14 % стручків; личинками ріпакового насінневого прихованохоботника в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин, 5 % стручків на 71 % обстежених площ. Альтернатіозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 47 % обстежених площ (182 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,5 екз. на кущ заселено і пошкоджено 22 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 55 % кущів, личинками в середній чисельності 6 шт. на кущ в середньому заселено 33 % кущів. Фітофторозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустиною попелицею в середній чисельності 13 екз. на заселену рослину пошкоджено 16 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 30 екз. на заселену рослину пошкоджено 100 % рослин.

На присадибних ділянках у пізній капусті гусеницями капустиної молі в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину пошкоджено 2 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину пошкоджено 25 % рослин.

В плодівих садах яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 5 % плодів в середньому на 50 % дерев, яблуневою попелицею в середній чисельності 5 екз. на лист пошкоджено 5 % листків в середньому на 40 % дерев. Паршею яблуні уражено 4 % листків з розвитком хвороби 2 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев на 100 % площ (5 га).