

Referências:

1-Critérios de elegibilidade médica para anticoncepcionais

Curtis KM, Tepper NK, Jatlaoui TC, Berry-Bibee E, Horton LG, Zapata LB, Simmons KB, Pagano HP, Jamieson DJ, Whiteman MK. US medical eligibility criteria for contraceptive use, 2016. Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports. 2016 Jul 29;65(3):1-03.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27467196/>

2-The levonorgestrel-releasing intrauterine system provides a reliable, long-term treatment option for women with idiopathic menorrhagia. Archives of gynecology and obstetrics. 2012 Jan 1;285(1):117-21

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21475963/>

3- Fertilidade após descontinuação da contracepção

Mansour D, Gemzell-Danielsson K, Inki P, Jensen JT. Fertility after discontinuation of contraception: a comprehensive review of the literature. Contraception. 2011 Nov 1;84(5):465-77

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22018120/>

4-Landing page Liberdade Vem De Dentro

<https://www.liberdadevemdedentro.com.br/pt-br>

5- O efeito da idade, paridade e índice de massa corporal na eficácia, segurança, colocação e satisfação do usuário associados a dois sistemas anticoncepcionais intrauterinos de levonorgestrel de baixa dosagem:

Gemzell-Danielsson K, Apter D, Hauck B, Schmelter T, Rybowski S, Rosen K, Nelson A. The effect of age, parity and body massindex on the efficacy, safety, placement and user satisfaction associated with two low-dose levonorgestrelintrauterine contraceptive systems: subgroup analyses of data from a phase III trial. PloS one. 2015 Sep17;10(9):e0135309;

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26378938/>