



EXPOSURE TO IMPETIGO

Date:

Dear Parent/Guardian:

There has been a case of Impetigo in your child's classroom.

What is impetigo?

Impetigo is a common skin infection in young children. It is caused by either Streptococci (strep) or staphylococcus (staph) bacteria.

What does the rash of impetigo look like?

- The rash is itchy and looks red and round, and may be oozing
- Small blisters containing pus-like material that may break and form flat, honey-like crusty stores
- The rash often appears on the face between the upper lip or nose and on the diaper area
- The rash can spread to other places on the skin
- The lesions or sores may last for 2-3 weeks or longer

What is the treatment of impetigo?

See your health care provider for treatment of impetigo. Untreated impetigo can lead to complications such as abscess, boils or a blood infection.

How is impetigo spread?

- Impetigo is spread by direct contact with infected skin
- It can also be spread by touching articles (clothing, bedding, washcloths, tissues) contaminated by contact with drainage from lesions/sores, or nose/throat secretions.

How can the spread of impetigo be prevented?

- Wash the rash with soap and water and cover it loosely with gauze, a bandage, or clothing to prevent scratching the rash
- Wash hands thoroughly, especially after touching an infected area of the body
- Use separate towels and washcloth
- Do not share bath water

RETURNING TO SCHOOL;


Your child may return to school after he/she has been treated with antibiotics for 24 hours. Lesions or sores should be covered in young children.

SCHOOL HEALTH SERVICES

www.cdc.gov/impetigo

Contra Costa Communicable Disease Guide 2007

CSNO Communicable Disease Field Guide 2010



EXPOSICIÓN A IMPÉTIGO

Fecha:

Estimado Padre/Tutor:

Se ha presentado un caso de impétigo en el aula de su hijo.

¿Qué es impétigo?

El impétigo es una infección común de la piel en niños pequeños. Es causada por las bacterias estreptococos o estafilococos.

¿Cómo se ve la erupción del impétigo?

- La erupción pica y se ve roja y redonda, y puede estar supurando
- Pequeñas ampollas que contienen material parecido al pus que pueden reventar y formar heridas planas con costras similares a la miel
- La erupción suele aparecer en la cara entre el labio superior o la nariz y en la zona del pañal
- La erupción se puede extender a otros lugares sobre la piel
- Las lesiones o heridas pueden durar 2-3 semanas o más

¿Cuál es el tratamiento para el impétigo?

Consulte a su proveedor de atención médica para el tratamiento del impétigo. El impétigo no tratado puede llevar a complicaciones como abscesos, forúnculos o una infección en la sangre.

¿Cómo se transmite el impétigo?

- El impétigo se propaga por contacto directo con la piel infectada
- También se puede contagiar al tocar artículos (ropa, ropa de cama, toallas, pañuelos) contaminados por la secreción de las lesiones/heridas o de la nariz/garganta

¿Cómo se puede prevenir el contagio del impétigo?

- Lave la erupción con agua y jabón y cúbrala ligeramente con una gaza, vendaje o ropa para evitar rascar la erupción
- Lave bien sus manos, especialmente después de tocar el área infectada del cuerpo
- Use toallas y pañuelos separados
- No comparta agua del baño

REGRESO A LA ESCUELA:

Su hijo puede regresar a la escuela después de que haya sido tratado con antibióticos durante 24 horas. Las lesiones o heridas deben cubrirse en los niños pequeños.

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR

www.cdc.gov/impetigo

Guía de enfermedades transmisibles Contra Costa 2007

Guía práctica de enfermedades transmisibles CSNO 2010