

**Практический навык (манипуляция):  
катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины) с  
использованием урологического катетера Нелатона для  
зabora moci na лабораторное исследование с  
использованием катетера**

*Таблица 1*

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	<p>Вымыл руки: <i>проговорил: «Руки вымыты».</i> Подготовил необходимое оснащение на манипуляционном столике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● масло вазелиновое стерильное;</li> <li>● водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,5 мг/мл;</li> <li>● катетер урологический Нелатона;</li> <li>● салфетки марлевые стерильные в индивидуальной упаковке;</li> <li>● контейнер стерильный для сбора биологического материала объемом не менее 100 мл;</li> <li>● лоток почкообразный;</li> <li>● перчатки стерильные;</li> <li>● перчатки нестерильные;</li> <li>● клеенка;</li> <li>● пеленка;</li> <li>● судно.</li> </ul>	2	
2.	<p>Провёл контроль годности медицинских изделий и ЛС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● проверил целостность упаковок медицинских изделий и стерильного перевязочного материала, их срок годности: <i>проговорил: «Целостность упаковок не нарушена, срок годности не истёк»;</i></li> <li>● проверил целостность флаконов, внешний вид ЛС, срок годности: <i>проговорил: «Целостность флаконов не нарушена, внешний вид ЛС не изменён, срок годности не истек».</i></li> </ul>	2	
3.	<p>Установил контакт с пациентом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>проговорил: «Здравствуйте. Меня зовут ... Я проведу Вам катетеризацию мочевого пузыря, Вы согласны?»;</i></li> </ul>	2	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● уточнил фамилия, имя, отчество, сверил с листом назначений: <i>проговорил</i>: «<i>Назовите свою фамилию и имя</i>»;</li> <li>● убедился, что пациентка подмылась: <i>проговорил</i>: «<i>Вы подмылись?</i>»;</li> <li>● положил на кушетку клеенку, сверху клеенки – пеленку;</li> <li>● предложил занять необходимое положение: <i>проговорил</i>: «<i>Снимите нательное белье с нижней половины туловища, прилягте на спину, согните ноги в коленях и разведите бедра</i>»;</li> <li>● поставил судно между ног пациента</li> </ul>		
4.	<p>Принял меры инфекционной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● надел фартук, нарукавники;</li> <li>● обработал руки: <i>проговорил</i>: «<i>Руки обработаны</i>»;</li> <li>● надел перчатки нестерильные</li> </ul>	2	
5.	<p>Обработал наружное отверстие уретры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● вскрыл упаковку с салфетками марлевыми;</li> <li>● открыл флакон с раствором хлоргексидина биглюконата, слил в лоток 1–2 мл раствора;</li> <li>● взял ведущей рукой салфетку из упаковки, смочил салфетку раствором хлоргексидина биглюконата, поливая из флакона на салфетку над лотком;</li> <li>● развел половые губы пациента первым и вторым пальцами неведущей руки, обработал салфеткой периуретральное пространство одним движением сверху вниз;</li> <li>● снял перчатки рабочей поверхностью внутрь;</li> <li>● обработал руки: <i>проговорил</i>: «<i>Руки обработаны</i>»;</li> <li>● использованные МИ<sup>1</sup> и отходы помещал в соответствии с НПА.</li> </ul>	4	
6.	<p>Подготовил необходимое оснащение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● открыл контейнер для сбора мочи, поместил крышку наружной поверхностью на столик манипуляционный;</li> <li>● вскрыл упаковку катетера со стороны коннектора;</li> </ul>	2	

<sup>1</sup> МИ – медицинские изделия

	<ul style="list-style-type: none"> <li>открыл флакон с вазелиновым маслом;</li> <li>вскрыл упаковку стерильных перчаток, не нарушая стерильности.</li> </ul>		
7.	<p>Принял меры инфекционной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обработал руки: <i>проговорил</i>: «Руки обработаны»;</li> <li>надел стерильные перчатки, не нарушая стерильности</li> </ul>	4	
8.	<p>Ввел катетер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>взял упаковку катетера неведущей рукой;</li> <li>захватил проксимальный конец катетера между четвертым и пятым пальцами ведущей руки. Перехватил катетер первым и вторым пальцами на расстоянии 3–4 см от дистального конца как писчее перо;</li> <li>облил дистальный конец катетера вазелиновым маслом, предварительно слив несколько капель в лоток;</li> <li>не касался катетера флаконом;</li> <li>раздвинул половые губы пациентки первым и вторым пальцами неведущей руки, ввел осторожно катетер в наружное отверстие мочеиспускательного канала на глубину 3–5 см до появления мочи;</li> <li>пережал проксимальный конец катетера</li> </ul>	4	
9	<p>Произвел забор мочи для лабораторного исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>, взял контейнер для сбора мочи и направил проксимальный конец катетера в контейнер, разжал катетер и собрал мочу в контейнер;</li> <li>направил проксимальный конец катетера в судно;</li> <li>закрыл контейнер с мочой и поставил на нижнюю полку столика манипуляционного</li> </ul>	4	
10.	<p>Удалил катетер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>извлек осторожно катетер, надавливая ребром ладони другой руки над лобком пациента;</li> <li>поместил катетер в контейнер «Физический метод. Катетеры»;</li> <li>убрал судно под кушетку;</li> </ul>	4	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>спросил у пациентки о ее самочувствии, попросил одеться: проговорил: «Как Вы себя чувствуете? Оденьтесь, пожалуйста»</li> </ul>		
11.	<p>Завершил манипуляцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>убрал пеленку и kleenку с кушетки, проговорил: «Поместил пеленку и kleenку в тару для сбора белья»;</li> <li>снял фартук, нарукавники, перчатки;</li> <li>обработал руки: проговорил: «Руки обработаны»;</li> <li>использованные МИ<sup>2</sup> и отходы помещал в соответствии с НПА;</li> <li>зарегистрировал выполненную манипуляцию в медицинской документации: проговорил: «Манипуляция зарегистрирована в медицинской документации»</li> </ul>	2	
<b>ВСЕГО</b>			

---

<sup>2</sup> МИ – медицинские изделия