Практический навык (манипуляция):
**катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины) с использованием урологического катетера Нелатона для забора мочи на лабораторное исследование с использованием катетера**

*Таблица 1*

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|---|---|---|---|
| 1. | Вымыл руки: *проговорил: «Руки вымыты».* Подготовил необходимое оснащение на манипуляционном столике:<br>● масло вазелиновое стерильное;<br>● водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,5 мг/мл;<br>● катетер урологический Нелатона;<br>● салфетки марлевые стерильные в индивидуальной упаковке;<br>● контейнер стерильный для сбора биологического материала объемом не менее 100 мл;<br>● лоток почкообразный;<br>● перчатки стерильные;<br>● перчатки нестерильные;<br>● клеенка;<br>● пеленка;<br>● судно. | 2 | |
| 2. | Провёл контроль годности медицинских изделий и ЛС:<br>● проверил целостность упаковок медицинских изделий и стерильного перевязочного материала, их срок годности: *проговорил: «Целостность упаковок не нарушена, срок годности не истёк»;*<br>● проверил целостность флаконов, внешний вид ЛС, срок годности: *проговорил: «Целость флаконов не нарушена, внешний вид ЛС не изменён, срок годности не истек».* | 2 | |
| 3. | Установил контакт с пациентом:<br>● *проговорил: «Здравствуйте. Меня зовут ... Я проведу Вам катетеризацию мочевого пузыря, Вы согласны?»;* | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● уточнил фамилия, имя, отчество, сверил с листом назначений: *проговорил: «Назовите свою фамилию и имя»*;<br>● убедился, что пациентка подмылась: *проговорил: «Вы подмылись?»;*<br>● положил на кушетку клеенку, сверху клеенки – пеленку;<br>● предложил занять необходимое положение: *проговорил: «Снимите нательное белье с нижней половины туловища, приляжте на спину, согните ноги в коленях и разведите бедра»;*<br>● поставил судно между ног пациента | | |
| 4. | Принял меры инфекционной безопасности:<br>● надел фартук, нарукавники;<br>● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»;*<br>● надел перчатки нестерильные | 2 | |
| 5. | Обработал наружное отверстие уретры:<br>● вскрыл упаковку с салфетками марлевыми;<br>● открыл флакон с раствором хлоргексидина биглюконата, слил в лоток 1−2 мл раствора;<br>● взял ведущей рукой салфетку из упаковки, смочил салфетку раствором хлоргексидина биглюконата, поливая из флакона на салфетку над лотком;<br>● развел половые губы пациента первым и вторым пальцами неведущей руки, обработал салфеткой периуретральное пространство одним движением сверху вниз;<br>● снял перчатки рабочей поверхностью внутрь;<br>● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»;*<br>● использованные МИ[1] и отходы помещал в соответствии с НПА. | 4 | |
| 6. | Подготовил необходимое оснащение:<br>● открыл контейнер для сбора мочи, поместил крышку наружной поверхностью на столик манипуляционный;<br>● вскрыл упаковку катетера со стороны коннектора; | 2 | |

[1] МИ – медицинские изделия

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● открыл флакон с вазелиновым маслом;<br>● вскрыл упаковку стерильных перчаток, не нарушая стерильности. | | |
| 7. | Принял меры инфекционной безопасности:<br>● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»*;<br>● надел стерильные перчатки, не нарушая стерильности | 4 | |
| 8. | Ввел катетер:<br>● взял упаковку катетера неведущей рукой;<br>● захватил проксимальный конец катетера между четвертым и пятым пальцами ведущей руки. Перехватил катетер первым и вторым пальцами на расстоянии 3−4 см от дистального конца как писчее перо;<br>● облил дистальный конец катетера вазелиновым маслом, предварительно слив несколько капель в лоток;<br>● не касался катетера флаконом;<br>● раздвинул половые губы пациентки первым и вторым пальцами неведущей руки, ввел осторожно катетер в наружное отверстие мочеиспускательного канала на глубину 3−5 см до появления мочи;<br>● пережал проксимальный конец катетера | 4 | |
| 9 | Произвел забор мочи для лабораторного исследования:<br>● , взял контейнер для сбора мочи и направил проксимальный конец катетера в контейнер, разжал катетер и собрал мочу в контейнер;<br>● направил проксимальный конец катетера в судно;<br>● закрыл контейнер с мочой и поставил на нижнюю полку столика манипуляционного | 4 | |
| 10. | Удалил катетер:<br>● извлек осторожно катетер, надавливая ребром ладони другой руки над лобком пациента;<br>● поместил катетер в контейнер «Физический метод. Катетеры»;<br>● убрал судно под кушетку; | 4 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● спросил у пациентки о ее самочувствии, попросил одеться: *проговорил: «Как Вы себя чувствуете? Оденьтесь, пожалуйста»* | | |
| 11. | Завершил манипуляцию:<br>● убрал пеленку и клеенку с кушетки, *проговорил: «Поместил пеленку и клеенку в тару для сбора белья»*;<br>● снял фартук, нарукавники, перчатки;<br>● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»*;<br>● использованные МИ[2] и отходы помещал в соответствии с НПА;<br>● зарегистрировал выполненную манипуляцию в медицинской документации: *проговорил: «Манипуляция зарегистрирована в медицинской документации»* | 2 | |
| | **ВСЕГО** | | |

[2] МИ – медицинские изделия