



(510) 679-3300
27206 Calaroga Ave - Ste 201
Hayward, CA 94545
BalanceMedico.com

Inyección de *Phenylephrine Hydrochloride* (Antídoto) Información Para Pacientes

¿Qué es el *Phenylephrine Hydrochloride*?

El *Phenylephrine Hydrochloride* (clorhidrato de fenilefrina en Español), también es conocido como Neo Synephrine y Neofrin. Es un fármaco que estimula los receptores alfa1 en los vasos sanguíneos y hace que los vasos sanguíneos se contraigan (vasoconstricción). Es un medicamento vasoconstrictor, estructuralmente similar a la epinefrina y la efedrina. La fenilefrina aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca sin afectar el ritmo cardíaco.

¿Cómo se usa el *Phenylephrine Hydrochloride* en Balance Médico?

Es un medicamento importante que se usa cuando un paciente tiene un priapismo que debe resolverse de inmediato y no se ha resuelto con otros medicamentos. Un priapismo es una erección que dura demasiado tiempo. Un priapismo puede desarrollarse sin estimulación sexual y no desaparece después del orgasmo.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar el *Phenylephrine Hydrochloride*?

Debe verificar que sea seguro tomar el *Phenylephrine Hydrochloride* con todos sus medicamentos y problemas de salud actuales. Informe a su proveedor de cualquier receta médica que tenga y si es alérgico a otros medicamentos, alimentos o sustancias, incluyendo los sulfitos.

El *Phenylephrine Hydrochloride* se debe usar con precaución con inhibidores MAO como selegilina (Eldepryl, Zelapar), fenelzina (Nardil), isocarboxazida (Marplan), porque también pueden aumentar la presión arterial y causar un episodio hipertensivo grave. Una reacción similar ocurre cuando el *Phenylephrine Hydrochloride* se combina con anfetamina y drogas relacionadas.

El *Phenylephrine Hydrochloride* debe usarse con precaución con antidepresivos como amitriptilina (Elavil, Endep), nortriptilina (Pamelor, Aventyl), doxepina (Sinequan, Adapin) y trazodona (Deyrel). Dichos antidepresivos pueden aumentar la presión arterial si se usan junto con el *Phenylephrine Hydrochloride*.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o problemas de salud que interactúan con el *Phenylephrine Hydrochloride*, así que asegúrese de informarle al médico todo lo que sabe sobre su salud y cualquier medicamento que tome, incluyendo los medicamentos recetados o de venta libre, los productos naturales, las hierbas y las vitaminas.



(510) 679-3300
27206 Calaroga Ave - Ste 201
Hayward, CA 94545
BalanceMedico.com

¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos del *Phenylephrine Hydrochloride*?

La gran mayoría de los pacientes no tienen efectos secundarios o solo tienen efectos secundarios menores. Este medicamento puede irritar la piel y causar enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.

Aunque puede ser raro, algunos pacientes pueden tener efectos secundarios, especialmente si son alérgicos a alguno de los ingredientes de la inyección, como el metabisulfito de sodio. Para minimizar el riesgo de efectos secundarios, notifique a su médico si es alérgico a algún medicamento, si actualmente está tomando medicamentos o si está bajo tratamiento por una afección médica aguda o crónica.

Informe a su médico u obtenga ayuda médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con una reacción alérgica grave, como sarpullido, urticaria, picazón, piel enrojecida/hinchada/con ampollas/descamación con o sin fiebre, sibilancias, opresión en el pecho o la garganta, dificultad para respirar/tragar/hablar, ronquera inusual o hinchazón de la boca, la cara, los labios, la lengua o la garganta.

Algunos efectos secundarios raros que debe conocer:

- Pueden aumentar la necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes con shock séptico.
- Dolor epigástrico, vómitos, náuseas
- Dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello, temblores
- Excitabilidad, ansiedad, inquietud
- Puede aumentar la presión arterial y causar latidos cardíacos anormales.
- Debido a sus efectos crecientes sobre la presión arterial, el *Phenylephrine Hydrochloride* puede precipitar angina en pacientes con arteriosclerosis grave o antecedentes de angina, exacerbar la insuficiencia cardíaca subyacente y aumentar la presión arterial pulmonar.
- Puede causar vasoconstricción periférica y visceral excesiva e isquemia de órganos vitales, particularmente en pacientes con enfermedad vascular periférica extensa.
- Puede causar necrosis o desprendimiento de tejido. El sitio de infusión debe ser revisado para ver si hay flujo libre.

Estos no son todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene preguntas sobre los efectos secundarios, hable con su médico.

Es importante que continúe consultando a su médico primario para su atención médica habitual, pruebas y mantenimiento de salud de rutina. No estamos reemplazando a su médico de cabecera.