

食用

1. 紅豆
短日照，秋分到寒露播種(或雙十節前)，或颱風過後即可播種。商業紅豆播種前先填殺重劑，花期時0噴催花，節果後噴落葉劑使統一成熟，才好用機器採收。怕淹水，播種到收成約30天。一台斤55元(5斤以48元計)。
2. 番薯
清明干插，夏天繁植，入秋採採數(北部)。插支時水不要多，以免腐爛。9月種，2月收(南部)；分枝要拉離地面，使養份集中到主根。插植後5~6個月採收。有芽番薯只適合養藤，不適合直接長番薯。
3. 番薯葉
紅葉、綠葉、翠綠葉、紅五爪、綠五爪、
4. 綠豆
春夏播種，2~3個月收成。粉綠頭口感佳，適合綠頭湯。油綠豆適合豆芽菜。豆芽菜，殺菌60度泡水5分鐘，室溫水泡6小時(冬8小時)使吸飽水份，瀝乾後等出芽，每天沖洗一次把生長產生的代謝物洗掉，發芽後不可見光。豆夾乾了即可採收，否則會裂開把豆子彈出。
5. 毛豆
春夏秋播種，行距60公分，株距10公分，5天發芽，40天開花，75天採收。南京路種子行，非基改黃豆1斤30元(5所以26元計)。黃豆、大豆、黑豆。
6. 蘆筍
多年生，播種25~30度，3月到秋初，太冷不出牙。種子泡水2天，每天換2次水，包在紗布中等露芽，再移到育苗區，育苗要5個月。
7. 芝麻(胡麻)
一年生草本，高1米，喜陽光怕冷耐旱，春播量少質佳，秋播量較多。秋作4天發牙，春作7天。春作開花後30天摘手，減少養份浪費。馬鈴薯[1, 2,]
8. 馬鈴薯
依芽眼切塊，每塊至少50克，切面沾灰盡或陰乾(勿日曬)，三月種植，間隔30公分以上，以防虫害，切面朝下，長高時堆土以防莖倒下。留時大芽以集中養份，七月中旬葉子開始枯萎時收成。
9. 芋頭：側芽繁殖；莖往上長，每月蓋一次土；要採收芋頭的就不要採收葉梗。[1, 2]十月後，葉黃及落葉時採收，水種與旱種皆有，水種也不要一直淹滿水。
10. 甜菠菜(紐西蘭菠菜)
11. 夏南瓜(櫛瓜)
[1, 2, 3]，株距1公尺。大的瓜會搶走小瓜的養分。台灣南部夏天超過25度時會著果不良，瓜體發育畸形。
12. 胡蘿蔔(紅蘿蔔)
散狀葉，散播後疏苗間隔20公分(移植會長不大或變形)。B.原子紅胡蘿蔔，C.黃金胡蘿蔔，D.深紫胡蘿蔔，E.迷你甜紅蘿蔔
13. 蘿蔔
塊狀葉，分為白蘿蔔(菜頭)、青蘿蔔和櫻桃蘿蔔三種，櫻桃蘿蔔[1]、
14. 蔥
分株栽培，要剪根使重長，可用植蔥器打洞，夏天深15公分，冬20公分。喜日照及冷涼，適溫18度C，好潮濕但忌泡水。北蔥稍低溫即抽苔、四季與大蔥較長的低溫期才能開花(故說四季蔥不開花)。韭蔥、紅蔥(紅蔥頭)、珠蔥、蔥頭
15. 洋蔥[1]
也是蔥屬，本土頭尖/黃進口較扁/白/紫。紫洋蔥開花會變成一堆小蔥苗。為3~4月採收()種不完的蔥苗可炒來吃。洋蔥頭發芽後種到土裡分成三株再重種，舊根切掉再重長。採收後吊著晾乾，保存不好會爛掉。恆春落山風把莖葉吹倒(美國彎折)，抑制莖葉生長，結球更大；葉片乾枯鱗莖即停止長大。
農業版：9月育苗...後略。
個人版：2017/11初，種下發芽洋蔥，X月分株定植；2018/4/4紫洋蔥留兩顆在田裏測試，葉桿不剪掉；雨季會不會爛掉???

16. 韮菜
多年生，不怕泡水？新生的根莖會長在老根莖上，要蓋土[1]。韮菜花為會開花的品種，只吃花不吃葉。
17. 薑
春天種植、冬至採收(一年薑)，隔年八月收者為老薑，薑會將土地養份全數吸收。缺水則停止塊莖肥大，高溫多雨易生病。薑種分塊後曬2~3天，使切口乾燥，避免腐爛，或種薑整片平鋪在育苗盒，發芽後再分塊移植。清明種植，老薑分塊掠乾，11月採收為嫩薑，一月枯黃為老薑，薑種100~200克，以供薑芽初期之養份，忌強光直射(半日照佳)。
粉薑：前一年乾枯，2018/4出芽，
18. 蒜
低溫 and 短日照時發牙生長(2~25度)，故宜入秋播種，高溫及長日照時結球，保存在25~30度C避免發牙。蒜頭。
19. 茄：多年生???番茄、茄子、青椒、辣椒
20. 芹：抽管芹、西洋芹、山芹、細葉香芹、紫陽大芹。巴西利(荷蘭芹)
21. 香菜(芫荽)
種子先搓開，泡水8~12小時，再冰8小時催芽，一個種子會發2棵苗(要先把子分開)，長高時根會浮出土面，要蓋土，長更高時改為半日照可減慢老化。小葉種較香。
22. 莧：不可移植，紅莧、全紅莧。
23. 秋葵(羊角豆)
常見青綠色為「黃秋葵」，分短胖型及瘦長型，另有紅秋葵(黃秋葵品種裡的紅色體系?)。耐熱不耐寒，全日照佳，花開一天即凋謝，花謝乙週可採收，「齊地」砍除隔年可重長？
南部整年可播種。結果不採收就能取得種子，種子多時可一孔播3顆。忌連作。
24. 赤道櫻草(日本黑朱菜)
25. 茼蒿：泡水4小時，冷藏4小時，弄乾後方便撒種，移植法長較快，間距20公分，。品種分圓葉及尖葉(山茼蒿)。
26. 菠菜：種子先泡水半天，點播，間隔30公分(越疏越大棵)，採收可取葉或拔整株。
27. 紅鳳菜
插枝即可繁殖，多年後老株芽才要重插枝。市場多為尖葉，圓葉較厚、紅鳳菜有臭腥味，白鳳菜無臭腥味。
28. 白鳳菜
生長快速，過分叢生，光線不足、通風不良時易得生理病，並引來莖腐病，整株枯死，應予適當的修剪。尖葉無毛種、圓葉有毛茸種。花是臭的???
29. 角豆：有長葉及短葉兩種。
30. 落葵(皇宮菜)：有紅骨及綠骨。插枝繁殖，喜高溫。冬天種子也可繁殖。
31. 川七
32. 紫蘇
33. 羅勒：一年生。紫羅勒。甜羅勒。
打拋葉(泰國九層塔)
九層塔，分綠骨及紅骨。沒摘花會死掉???
34. 萵苣：散播後移植間隔20公分。大陸妹(福山萵苣)、紅葉皺葉萵苣。
35. 甜菜(恭菜)
茄菜、甜菜根、火焰菜、黃金火焰菜。夏末育苗，秋初種植，土要鬆，葉紅表示缺肥，舊葉枯萎時可採收，第二年感受底溫時開花結子。活不到第二年???
36. 芝麻菜：十字花科(要防白紋蝶)
37. 十字花科：高麗菜(結球時切十字較易開花)、花菜、大頭菜(蕪菁)
38. 芥菜：捲芥

39. 紫花曼陀羅, 白花、橙花
40. 洛神葵: 一年生, 春季播種或扦插, 秋季開花, 冬季採收、喜溫暖濕潤, 長高2~3公尺。
41. 草莓:
42. 薄荷
43. 左手香: 標準版、小葉版、鑲邊版、斑葉版。
44. 白里香: 多年生, 高15~30公分, 但枝條軟, 光線不足或過高會倒伏, 不耐濕, 台灣未見過開花?
45. 貓草
46. 玉米: 白玉米、甜玉米、糯玉米
47. 艾草: 插枝可繁殖,
48. 葛鬱金(粉薑、竹芋): 冬天莖葉乾枯可採收12月, 4月冒芽開始種, 水份需充足但排水良好。整株拔起, 摘下大的塊根, 再種回去???
181212採收一叢, 纖維很多, 可能種太久(忘記何時種的)。
莖會分支。耐風。
- 49.
50. 小茴香、大茴香、球莖茴香、八角茴香。
51. 月桃
52. 木瓜
有雄株和雌株與兩性株三種, 種子及育苗仍無法分辨。雄株基本上是會開花不會結果(除非給予逆境來迫使轉性), 而雌株果型大而圓, 但空心也大, 兩性株果型長而尖, 但果肉厚度較多, 品質也比較好。原因 在於草質莖不耐強風吹, 根系呼吸能力較強而不耐積水, 所以休閒栽培上。並不是果實大就適合採收, 首先必須先見到果實側面產生果溝, 然後再注意果尾的轉色, 當果尾乳突處開始轉黃, 才是進入採收適期。(不擔心被偷則可全黃再採收)[[農糧署](#)]。長太高摘不到。
53. 鳳梨
冠芽正常一株只產生1枚, 在4種芽體中是葉數最多的一種, 種植後發根也多, 發育旺盛且整齊, 果實大, 成熟期整齊, 若是處理不當, 容易受心腐病為害, 所以一般果農多不採用。
把肉全都殺光光, 不要留肉喔, 再拿到太陽公公下去曬, 曬三天上下, 此時會乾乾的, 不要怕, 再去種, 此時土不要濕濕的, 也不要使用水, 讓它乾下去了, 不要怕, 不會死的, 不過要種穩一點喔。因為鳳梨很易得心腐病, 曬乾時才不易得, 不會死掉的喔。
54. 香蕉
每株香蕉只開花結果一次, 結果時要支撐, 否則樹幹會折斷。
55. 甘蔗: 倒了會不甜。紅甘蔗、白甘蔗、粗白甘蔗。
56. 斑葉地毯草、錦竹草(鋪地、大葉、直紋)、怡心草、
57. 百合科沿階草屬: 玉龍草(短草沿階草/矮麥冬?)、白紋草(白邊/塊根)、沿階草(銀邊、麥冬)、
58. 闊葉油點百合(麻點百合): 少日照葉子會長。油點百合[1]
59. 矮仙丹: 圍牆植物, 插枝可繁殖
60. 福建茶
61. 南瓜
62. 花生
63. 紅藜: 20公分高時可摘10公分當菜炒(手折不斷就是太粗), 種子洗到沒泡即可煮來吃[1]。紅藜推廣手冊[2]
64. 樹豆

65. 樹薯：白皮有毒，紅皮才能吃。小葉吃葉，大葉吃薯。2CM粗的莖長20CM，插三分之二在土中。
[1]你不認識的老朋友-樹薯，[2]在台灣落地生根的植物：澱粉之王——木薯，[3]木薯育成品系及育種歷史

功能性

1. 月桃
2. 姑婆芋

圍牆用

1. 矮仙丹(小葉)
花有多種顏色
2. 福建茶
有水就長很快，整支長長，不剪不分支，剛剪完又很醜。
3. 七里香

觀賞用

1. 鴨跖草目\鴨跖草科
 - (1) 蚌蘭屬
大蚌蘭(易開花)、小葉蚌蘭、彩葉蚌蘭
 - (2) 錦竹草屬(Callisia)
大葉錦竹、鋪地錦竹、
 - (3) 紫露草屬(Tradescantia)或紫錦草屬(Setcreasea)
雪絹、
 - (4) Tripogandra屬
怡心草
2. 百合科
3. 景天科：玉綴
 - (1) 青鎖龍屬：小米星、星王子、黃金花月(與雅樂之舞、金枝玉葉有何不同)、波尼亞(低矮/紅枝/莆伏)、
 - (2) 石蓮花屬：沙地葡萄
4. 大戟科：
 - (1) 春風(錦)、
 - (2) 綠威麒麟、皺葉麒麟、彩葉麒麟
 - (3) 稚兒麒麟
5. 天門冬科
 - (1) 龍舌蘭亞科(根部直接長葉子)
 - i. 龍舌蘭屬(長小孩)：
雷神、笹之雪、影武者、
 - ii. 吊蘭屬(走莖)：
白邊、綠邊、全綠(全家後門)、竹葉、葉過長而折斷為缺光。
小白紋草(塊根、不走莖)、大白紋草A(四橫巷)、大白紋草B(公園路)、黃綠紋草(農會全聯)
 - iii. 沿階草屬：
全綠、銀紋、玉龍草(矮)
 - iv. 虎尾蘭屬(地下莖、出錦、薄葉)
 - *矮全綠、*矮虎斑、
 - *矮全綠金邊、大全綠金邊(九鵬基地)
 - *矮直紋(黃短葉千歲)、消光矮金邊(林森路東段，特立屋旁飲料店)、*矮虎斑金邊(QQ球對面)、*銅鑄(Sansevieria Kirkii Pulchra Coppertone)、
 - 矮?蓮花(單車道機車店、民眾醫院南)
 - *短金邊、短虎斑(麟洛素炸旁)、
 - *長金邊、*長虎斑、*寶扇(大樹，帥府宮，建國路98巷)、*石筆(去山地門路邊，宏陽機車旁，高雄新興公園西側)、*棒葉(長治，麟洛)、消光長(池上)
 - (姬鮑魚 六甲星速對面)、佛手、青蟹、、)
 - *虎斑消光長：廣東南路牆邊、麟洛田尾街
 - *直紋消光短：體育館西邊透天
 - *黃金短：家樂福後面，中正路安全島一堆，安心四橫巷
 - *白玉：車城路口。
 - *待查：中庄八德路補習班。

6. 蘆薈科(舊稱百合科):

庫拉索蘆薈、木立蘆薈、綾錦(珍珠蘆薈)、墨玉蘆薈、

(1) 鯊魚掌屬:綠冰臥牛(磯松錦)、子寶錦臥牛、

7. 其它

(1) 血葉蘭:生於海拔900-1300米的山坡或溝谷常綠闊葉林下陰濕處。一般每隔三年分株一次,春秋兩季均可,分株前要減少灌水。

(2) 卧地延命草

(3) 天南星科:美鐵芋

(4) 竹芋科:XX竹芋、柳眉、豹紋、銀線