

Epreuve de PHYSIQUE**I Centrale TSI 1999****Exemples de dynamique stellaire et galactique**

Les deux parties du problème sont indépendantes.

Données numériques :

Constante de gravitation internationale (S.I.)	: $G = 6,7 \cdot 10^{-11}$ unité du système
Masse du soleil	: $M_S = 2 \cdot 10^{30}$ kg
Rayon du soleil	: $R_S = 7 \cdot 10^8$ m
Masse de la terre	: $m_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg
Rayon de la terre	: $R_T = 6,4 \cdot 10^6$ m
Accélération de la pesanteur au niveau du sol	: $g = 9,8$ m.s ⁻²
Distance moyenne terre-soleil	: $d = 1,5 \cdot 10^{11}$ m
Vitesse de la lumière dans le vide	: $c = 3 \cdot 10^8$ m.s ⁻¹
Année-lumière (notée al)	: 1 al (10^{16} m

Première partie**Preliminaire**

On considère le mouvement circulaire d'une planète, de masse m , en orbite à la distance r du soleil sous la seule action de la force gravitationnelle du soleil.

Exprimer cette force gravitationnelle en fonction de G , M_S , m et r . En déduire la dimension physique de la constante G en fonction des seules unités de base du système S.I.

Etablir la relation liant la période orbitale T du mouvement de la planète au rayon r et aux paramètres G et M_S . On obtient ainsi une expression simplifiée de la troisième loi dite de Kepler.

1.2 Application

Notre galaxie, dont la trace sur le ciel nocturne est appelée « voie lactée », est un système formé d'un grand nombre d'étoiles animées autour de leur centre de masse commun de mouvements orbitaux supposés analogues à ceux des planètes autour du soleil. La figure 1 représente le schéma de notre galaxie vue en coupe avec ses trois parties caractéristiques : bulbe central, disque, halo sphérique d'amas d'étoiles (appelé amas globulaire). Le soleil est localisé au niveau du disque galactique, à une distance D ($30\,000$ al) du cœur de la galaxie ; il décrit autour du noyau galactique une orbite circulaire en une période $T_S = 250 \cdot 10^6$ années soit $T_S = 7,88 \cdot 10^{15}$ s.

On supposera que toutes les masses confinées à l'intérieur d'une sphère de rayon D agissent comme si elles se trouvaient au centre de la galaxie.

Donner une estimation grossière de la masse M de la galaxie, en kilogrammes, puis en unités de masse solaire M_S .

Comparer le nombre INCORPORER Equation.3 à l'évaluation $N = 6.10^{11}$ déduite par les astronomes à partir d'études de rotation de notre galaxie. Interpréter simplement l'écart entre ces deux valeurs.

En admettant que la masse moyenne d'une étoile est de l'ordre de la masse du soleil M_S , donner, pour l'ensemble de la galaxie (bulbe central, disque, halo sphérique : figure 1) l'ordre de grandeur de la densité d'étoiles, exprimée en nombre n_0 d'étoiles par année-lumière.

Généralisation de la troisième loi de Kepler

On considère deux étoiles (supposées « ponctuelles ») E_1 et E_2 d'un « système binaire », de masses respectives m_1 et m_2 ; on néglige toute interaction autre que l'interaction gravitationnelle qui existe entre les deux étoiles (on suppose donc que les deux étoiles forment un système isolé) et on appelle C leur centre de masse. Les deux étoiles E_1 et E_2 décrivent des orbites circulaires de centre C et de rayons respectifs r_1 et r_2 ; on pose $d = r_1 + r_2$.

Expliquer pourquoi les deux étoiles ont la même période orbitale T et montrer que INCORPORER Equation.3.

Montrer que la période orbitale T est donnée par l'expression $T = \text{INCORPORER Equation.3}$. Que devient cette expression si $m_1 \gg m_2$? Comparer avec le résultat de la question 1.1.2.

Application numérique : deux étoiles, Alpha et Bêta, décrivent deux orbites circulaires de rayons respectifs $r_1 = 1,00.10^9 \text{ km}$ et $r_2 = 5,0.10^8 \text{ km}$ avec une période orbitale $T = 44,5$ années. Déterminer les masses m_1 et m_2 de ces deux étoiles en kilogrammes, puis en unités de masse solaire M_S .

Vitesses de libération

Exprimer l'énergie totale initiale E_0 d'un satellite artificiel de masse m lancé avec une vitesse v_0 à partir de la surface d'une planète (à symétrie sphérique) de rayon R et de masse M .

Exprimer de même l'énergie totale E du satellite en un point quelconque en fonction de la distance r de ce point au centre de la planète et de la vitesse v du satellite en ce point.

En déduire, en l'absence de frottement, la vitesse minimale v_L , appelée vitesse de libération, qui doit être « initialement » communiquée au satellite pour qu'il puisse s'éloigner indéfiniment de la planète. On exprimera v_L en fonction de G , M et R .

Application numérique :

Cas d'un satellite terrestre : exprimer la vitesse de libération v_L en fonction du rayon terrestre R_T et de l'accélération de la pesanteur g au niveau du sol. Faire l'application numérique.

Pourrait-on communiquer une telle vitesse à un satellite au niveau du sol ?

Cas d'une particule au voisinage du soleil : déterminer la valeur numérique de « la vitesse de libération » v_L d'un ion produit à la surface du soleil.

Dans le cas du soleil, exprimer la vitesse de libération v_L en fonction de la constante de gravitation G , du rayon R_S du soleil et de la masse volumique moyenne (ρ du soleil). Quelle indication peut-on en déduire pour d'autres étoiles de structure interne comparable ?

Etoile de Laplace : en 1798, dans « Exposition du Système du Monde », Laplace imagine un astre de même masse volumique moyenne que la terre, soit (T , et de diamètre égal à 250 fois celle du soleil).

Quelle est la vitesse de libération correspondante à partir de la surface de l'astre ? Pourquoi Laplace conclut-il qu'un tel astre empêche la lumière de quitter sa surface, le rendant ainsi invisible ? Dans la terminologie actuelle, celle de la Relativité Générale, un tel « objet » est décrit comme un « trou noir ».

Rayon de Schwarzschild : on admet qu'un corps de masse M agit comme un trou noir si son rayon R est inférieur à un certain rayon critique R_C appelé rayon de Schwarzschild, défini par une vitesse de libération à la surface de ce corps égale à la vitesse de la lumière dans le vide, soit $v_l = c$.

Exprimer R_C en fonction de G , M et c .

Application numérique : calculer le rayon de Schwarzschild R_C dans le cas du soleil, puis de la terre.

Exprimer la force gravitationnelle F_{TN} exercée par un trou noir sur un objet en fonction de la masse m de l'objet, de sa distance r au centre du trou noir, du rayon de Schwarzschild R_C du trou noir et de c .

Application numérique : calculer F_{TN} pour $R_C = 8,9 \text{ mm}$, $m = 3 \text{ kg}$, $r = 6000 \text{ km}$

Calculer l'accélération de la pesanteur g_{TN} au niveau de la sphère de Schwarzschild en fonction R_C et c .

Application numérique : calculer g_{TN} pour $R_C = 8,9 \text{ mm}$.

On appelle « sphère des événements » la sphère de rayon R_C . Justifier qualitativement le choix de ce terme.

Application au cœur de notre galaxie

Des astronomes ont observé un petit objet massif au centre de notre galaxie. Un anneau de matière est en orbite circulaire autour de cet objet massif. L'anneau a un diamètre de 15 al et sa vitesse orbitale est voisine de 200 km.s^{-1} .

En supposant la masse de l'objet massif très supérieure à celle de l'anneau, déterminer la masse M_{OM} de cet objet massif, en kilogrammes, puis en unité de masse solaire (cf question 1.1.2).

L'observation des étoiles, aussi bien que les théories modernes de leur structure, montrent qu'il est pratiquement impossible pour une étoile simple, d'avoir une masse supérieure à environ 50 masses solaires. L'objet massif précédent peut-il être une étoile ?

La plupart des astronomes pensent actuellement que l'objet massif situé au centre de notre galaxie, et dont la masse M_{OM} a été déterminée en 1.7.1., est un trou noir. S'il en est ainsi, quel est son rayon de Schwarzschild R_C et comparer la valeur numérique ainsi obtenue à la distance moyenne d entre la terre et le soleil.

Un candidat privilégié au statut de trou noir est Cygnus X-1, ainsi nommée parce qu'elle fut la première source de rayons X découverte dans la constellation du Cygne. Or, Cygnus X-1 est un système binaire localisé à 8000 al de la terre. Les deux objets de ce système sont respectivement une étoile supergéante bleue, notée HDE226868 et un objet compact non directement « visible » identifié à un trou noir. La période orbitale de Cygnus X-1 est $T=5,6$ jours. La masse de l'étoile supergéante HDE226868 est estimée à $m_1=30 \text{ MS}$ et celle du trou noir à $m_2=6 \text{ MS}$. En supposant les orbites circulaires, déterminer les valeurs numériques du rayon de l'orbite et de la vitesse orbitale de chaque objet. Comparer ces résultats au rayon orbital d et à la vitesse orbitale v_T de la terre dans son mouvement autour du soleil.

Seconde partie : théorie dite « épicyclique » du premier ordre du mouvement stellaire pour une galaxie en forme de disque.

En réalité, peu de galaxies répondent à une symétrie sphérique même approximative. Dans cette seconde partie, nous explorons les types d'orbites possibles, dans un potentiel moyen U , dit axisymétrique.

Un point M est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, ϕ, z) centrées sur le noyau galactique C (figure 2). L'axe z est aligné avec l'axe de symétrie de la galaxie et le potentiel axisymétrique U est fonction des seules coordonnées r et z , soit $U = U(r, z)$; en outre, la fonction $U(r, z)$ est symétrique par rapport au plan équatorial $z=0$ et on a donc $U(r, z) = U(r, -z)$.

Justifier brièvement que $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_z \right) = 0$.

On s'intéresse au mouvement d'une étoile témoin de masse unité (assimilable à un point matériel M), dans le potentiel axisymétrique U .

Ecrire la relation fondamentale de la dynamique et en déduire trois équations du mouvement (utilisant les coordonnées cylindriques r, ϕ, z et le potentiel U ou ses dérivées par rapport à r, ϕ, z).

Montrer que la composante du moment cinétique de la particule sur l'axe Oz est conservée au cours du mouvement; on notera L_0 cette constante.

En déduire que l'étude générale du mouvement du point M peut alors être ramenée à un problème à deux inconnues r et z régi par les équations :

$$\frac{1}{2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \dot{z}^2 + U(r, z) = E \quad \text{et} \quad r^2 \dot{\phi} = L_0$$

dans le plan méridien (CMH). Ce plan est animé d'un mouvement de rotation de vitesse $\dot{\phi}$ (= $\frac{L_0}{r^2}$) généralement non uniforme.

Donner l'expression du potentiel U_{eff} appelé « potentiel effectif » en fonction de $U(r, z)$, L_0 et r .

Vérifier qu'un mouvement circulaire uniforme dans le plan équatorial $z=0$ correspond à un minimum du potentiel effectif U_{eff} . En désignant par R le rayon de cette trajectoire circulaire, exprimer la vitesse angulaire $\dot{\phi}$ en fonction de R et de L_0 .

Ecrire l'énergie totale E de l'étoile de masse unité dans le potentiel axisymétrique $U(r, z)$. A quelle inégalité doivent satisfaire E et U_{eff} .

Approximation épicyclique : dans les galaxies à disque, de nombreuses étoiles suivent des trajectoires presque circulaires.

On pose $r = R + p$, R correspondant à la trajectoire circulaire particulière étudiée à la question 2.2.4. et on peut considérer que le potentiel U_{eff} devient alors fonction des paramètres p et z : $U_{\text{eff}} = U_{\text{eff}}(p, z)$ avec $p \ll R$ et $z \ll R$. En outre, les coordonnées $(p=0, z=0)$ ne sont autres que les coordonnées du minimum de U_{eff} dans le plan méridien (CMH).

Effectuer un développement limité de la fonction U_{eff} au voisinage du point $(0,0)$ et montrer que U_{eff} peut se mettre sous la forme : $U_{\text{eff}}(p, z) = A p^2 + B z^2 + \text{Constante}$, à des termes du troisième ordre près en p ou en z . Déterminer les constantes A et B en fonction des valeurs des dérivées secondes de la fonction U_{eff} au point $(0,0)$.

Montrer que les équations du mouvement peuvent ainsi se mettre sous la forme, dite « harmonique », suivante : $\ddot{p} + \omega_p^2 p = 0$ et $\ddot{z} + \omega_z^2 z = 0$

(ω_p est appelée pulsation épicyclique : montrer que ω_p^2 peut s'écrire sous la forme $\omega_p^2 = \frac{1}{R} \frac{d^2 U_{\text{eff}}}{dp^2}$ où $\dot{\phi}$ est la vitesse angulaire définie à la question 2.2.4. et n un entier que l'on déterminera.

(ω_z est appelée pulsation verticale : exprimer ω_z^2 en fonction de $\frac{d^2 U_{\text{eff}}}{dz^2}$).

En pratique, près du centre d'une galaxie, la vitesse angulaire $\dot{\phi}$ est pratiquement indépendante de R (la rotation est dite rigide : $\dot{\phi}$ est sensiblement constante). Montrer que cette situation correspond à un potentiel U harmonique, de la forme $U_H = \frac{1}{2} k r^2$ (k constante).

D'autre part, la décroissance de $\dot{\phi}$ est rarement plus rapide que dans le cas d'un potentiel U newtonien, de la forme $U_N = -\frac{k'}{r}$ (k' constant).

Quelles sont les valeurs limites de ω_p correspondant à ces deux situations extrêmes. On

exprimera ces deux valeurs de ϕ en fonction de ϕ_0 .

Montrer que, dans le cadre de l'approximation épicyclique, les constantes du mouvement sont au nombre de trois. Préciser quelles peuvent être ces constantes (on pourra par exemple utiliser les équations du mouvement obtenues à la question 2.3.2.).

On écrit la solution de l'équation radiale en r sous la forme $r = R + p$ avec $p = p_0 \cos((1 + \epsilon)t + \phi_0)$ et $0 < p_0 \ll R$. Montrer, au moyen d'un développement limité simple de r au voisinage de R , que la variable angulaire ϕ peut s'écrire sous la forme $\phi = (0 + \epsilon)t + \phi_0 + \epsilon s$ ($s \ll R$, ϵ constante). Déterminer s en fonction de ϕ_0 , R , ϵ , p_0 et du temps t . Définir l'amplitude s_0 de la fonction s et calculer le rapport ϵ en fonction de ϕ_0 et ϵ . Donner les valeurs de ce rapport dans le cas d'un potentiel harmonique UH, puis d'un potentiel newtonien UN.

On se place le référentiel (M_0, p, s, z) , centré sur l'épicentre M_0 de coordonnées $(r=R, \phi=\phi_0, z=0)$ et « tournant » à la vitesse Ω autour de l'axe Oz. On rappelle que $p \ll R$ et $s \ll R$ et que, par suite, sur une distance de l'ordre de p_0 ou s_0 , on peut assimiler l'arc de cercle de rayon R à un segment de droite (figure 3).

Tracer la courbe représentant la projection de la trajectoire de l'étoile dans le plan (M_0, p, s) . Quelle est l'allure de cette courbe ? Dans quel sens cette courbe, appelée épicycle, est-elle décrite ?

Que peut-on dire du mouvement suivant l'axe $M_0 z$ par rapport aux deux autres mouvements (suivant $M_0 p$ et $M_0 s$) ?

2.3.7. Représenter l'allure de la projection de la trajectoire de l'étoile dans le plan équatorial (C, x, y) de la galaxie. Cette trajectoire ressemble à une « rosette » présentant un certain nombre de lobes par tour ; exprimer ce nombre en fonction de ϕ_0 et ϵ .

2.3.8. Le soleil effectue 1,3 oscillations dans la direction radiale pendant qu'il décrit une orbite complète dans le plan galactique. L'orbite du soleil se ferme-t-elle sur elle-même ? Déterminer la valeur numérique de ϵ sachant que la période du soleil vaut $\text{INCORPORER Equation.3} = 2,4.108$ années.

2.3.9. A quelle condition portant sur le rapport ϵ la projection de la trajectoire dans le plan équatorial (C, x, y) ressemble-t-elle à une ellipse ?