

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОТИВ САПА
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 июня 2007 г.
N 354

(САЗ 07-29)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 13 июля 2007 г.
Регистрационный N 3998

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 1994 года "О ветеринарной деятельности" (СЗМР 94-3,4), с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28) и от 3 апреля 2006 года N 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15) и на основании Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля 2007 года N 256 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-15), Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2006 года N 481 "Об утверждении Положения Государственной службы ветеринарного и фитосанитарного благополучия Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики" (рег. N 3785 от 19 января 2007 года) (САЗ 07-04), и в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, а также предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о мероприятиях против сапа в Приднестровской Молдавской Республике. (Приложение).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы ветеринарного и фитосанитарного благополучия Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики Ткаченко В.Д.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования

МИНИСТР

И. ТКАЧЕНКО

г. Тирасполь
19 июня 2007 г.
N 354

Приложение к Приказу
Министра здравоохранения
и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики
от 19.06.2007 г. N 354

Инструкция о мероприятиях против сапа в
Приднестровской Молдавской Республике.

1. Область применения

Настоящие правила обязательны для выполнения на всей территории Приднестровской Молдавской Республики государственными органами, организациями, иными хозяйственными субъектами независимо от их принадлежности и форм собственности, должностными лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями в области борьбы против сапа в Приднестровской Молдавской Республике. Руководители организаций

и владельцы животных в соответствии с ветеринарным законодательством Приднестровской Молдавской Республики несут ответственность за своевременное проведение предусмотренных настоящей инструкцией мероприятий.

2. Мероприятия по предупреждению заболевания сапом

1. Все лошади, а также ослы и мулы во всех, без исключения, организациях (предприятиях, учреждениях, индивидуальных хозяйствах и др.), в районах, городах (согласно административно-территориальному устройству), где регистрируются случаи заболевания сапом или выделяются лошади, положительно реагирующие на маллеин (маллеиншики), подвергаются обязательному клиническому осмотру и исследованию методом двукратной глазной маллеинизации с интервалом 5-6 дней не менее двух раз в год.

Вопрос о необходимости обязательного исследования лошадей на сап в республике решается Главным государственным ветеринарным инспектором Приднестровской Молдавской Республики, в зависимости от эпизоотической обстановки. Это исследование включают в план противоэпизоотических мероприятий.

Время, порядок и место обследования объявляются соответствующими постановлениями государственной администрации города (района).

2. Всех лошадей, вновь приобретаемых для государственных и негосударственных организаций, вне зависимости от благополучия района по сапу, подвергают на месте приобретения поголовному ветеринарно-врачебному клиническому обследованию и двукратной глазной маллеинизации и допускают в организацию только при отрицательных результатах исследований.

3. Всех лошадей, прибывших в организацию, подвергают клиническому обследованию и однократной глазной маллеинизации и содержат в отдельной конюшне. По истечении срока карантина лошадей подвергают вторичному клиническому осмотру и однократной глазной маллеинизации. При отрицательных результатах исследований их допускают в общие конюшни, табуны и т. д.

В случаях обнаружения в карантине лошадей с клиникой сапа или положительно реагирующих на маллеин этих лошадей объявляют неблагополучными по сапу и с ними поступают согласно указаниям настоящей инструкции.

Примечание. В период карантина допускается эксплуатация лошадей при условии использования их обособленно от местных лошадей.

3. Мероприятия при появлении сапа в организации

4. При появлении каких-либо признаков заболевания лошадей сапом, впредь до установления окончательного диагноза, проводятся следующие мероприятия:

а) всех подозрительных по заболеванию сапом лошадей отделяют от здоровых и ставят их в условия строгой изоляции;

б) для ухода за этими лошадьми выделяют специальных лиц, не допуская их для ухода за здоровым конским поголовьем;

в) проводят дезинфекцию помещений, где находились подозрительные по заболеванию сапом лошади, и предметов ухода.

5. Ветеринарный врач или ветфельдшер при установлении диагноза на сап (клинически или путем маллеинизации) совместно с руководителем организации определяет неблагополучную группу лошадей (хозяйство, табун, бригаду), объединенную общей конюшней, водопоем, пастбищем или совместной работой.

6. На неблагополучные по сапу организации или населенные пункты накладывают карантин в порядке, предусмотренном Ветеринарным Уставом Приднестровской Молдавской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики [от 12 мая 1995 года N 156](#) (САНП 95-5).

Карантинированию подлежат, в зависимости от размеров распространения сапа, отдельные неблагополучные бригады, фермы, конюшни, табуны, хозяйства, пункты.

7. Ветеринарный врач или ветфельдшер перед наложением карантина обязан: установить время появления сапа и количество выявленных больных лошадей; выяснить, какие лошади и откуда за это время поступили в организацию и куда выбыли из него; немедленно сообщить о появлении сапа главному ветеринарному врачу района (города) государственной администрации района (города).

8. О появлении сапа главный ветврач района (города) немедленно доводит до сведения Главный государственный ветеринарный орган Приднестровской Молдавской Республики, главных ветеринарных врачей соседних районов (городов), санитарно-эпидемиологическую службу расположенной на данной территории.

9. Государственная администрация района (города) обязана вывесить на дорогах, ведущих к неблагополучному по сапу пункту, оповестительные знаки о карантине и установить сторожевые посты.

10. По условиям карантина запрещается:

а) выезд на лошадях карантинированной организации или части ее за пределы -карантинированной территории;

б) въезд в карантинированную организацию на лошадях из других организаций;

в) перегруппировка, обмен и продажа лошадей;

г) убой на мясо, эксплуатация лошадей в кумысолечебных заведениях, случка больных и подозрительных по заболеванию сапом животных;

д) вывоз объемистого фуража, убранного лошадьми, среди которых во время уборки были обнаружены больные сапом лошади. Этот фураж используют для скармливания невосприимчивым к сапу животным внутри неблагополучной организации (пункта).

11. Выезд из карантинированных организаций разрешается на автотранспорте.

4. Мероприятия в организациях, неблагополучных по сапу

12. Ветеринарный врач или ветфельдшер исследует всех лошадей путем клинического осмотра и двукратной маллеинизации. Исследование маллеином производят в соответствии с наставлением по его применению.

В зависимости от результата исследования все конское поголовье неблагополучной организации (или части ее) подразделяют на четыре группы:

а) первая группа - лошади с явной клиникой сапа;

б) вторая группа - лошади, имеющие неясные клинические признаки заболевания сапом и дающие положительный или сомнительный результат глазной маллеинизации;

в) третья группа - лошади, не имеющие никаких подозрительных на сан клинических признаков, но дающие положительные или сомнительные результаты глазной маллеинизации;

г) четвертая группа - лошади, подозреваемые в заражении сапом, к которым относится все остальное конское поголовье неблагополучной по сапу организации или части ее, отрицательно реагирующее на маллеин.

13. После разбивки на группы мероприятия проводят по отношению к каждой группе лошадей в отдельности. Клинический осмотр всех лошадей в организации проводят не реже одного раза в 3-5 дней.

14. Представители государственной ветеринарной службы в целях ограждения людей от заражения сапом принимают необходимые меры к соблюдению санитарных правил, предусмотренных нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

5. Мероприятия в отношении явно больных сапом лошадей (первая группа)

15. Явно больных сапом лошадей уничтожают. Жеребят-сосунов от кобыл, явно больных сапом, уничтожают без всякого исследования. При этом:

а) заключение о наличии явных клинических признаков сапа у лошадей дает только государственный ветеринарный врач. С целью подтверждения клинического диагноза, лошади подвергаются маллеинизации;

б) на лошадей, подлежащих уничтожению, составляется акт;

в) вскрытие трупов явно больных сапом лошадей и снятие с них кож запрещается;

г) уборка трупов уничтоженных или павших от сапа лошадей производится немедленно с соблюдением действующих "Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в Приднестровской Молдавской Республике".

6. Мероприятия в отношении лошадей, имеющих неясные клинические признаки заболевания сапом (вторая группа)

16. Лошадей 2-й группы, имеющих неясные клинические признаки заболевания сапом и положительно реагирующих на маллеин при глазной маллеинизации, изолируют в сапизолятор и на 5-6-й день повторно подвергают глазной маллеинизации.

У лошадей, дающих положительную реакцию глазной маллеинизации, исследуют кровь по реакции связывания компонентов (далее – РСК). При получении положительной реакции по РСК лошадь признают больной сапом и уничтожают, а при отрицательной реакции – признают маллеинщиком.

Лошадей, у которых на 5-6-й день будет получен отрицательный или сомнительный результат глазной маллеинизации, подвергают глазной маллеинизации еще раз на 15-й день и при получении снова отрицательного результата переводят в 4-ю группу, и далее с ними поступают, как с лошадьми этой группы.

При получении на 15-й день положительной или сомнительной реакции таких лошадей подвергают исследованию по РСК. При получении положительной реакции по РСК лошадь признают больной сапом и уничтожают, а при отрицательной реакции – признают маллеинщиком. При получении сомнительной реакции по РСК или при других несовпадающих показателях реакций (сомнительные) лошадей подвергают подкожной маллеинизации, и вопрос о них решается комиссионно.

7. Мероприятия в отношении лошадей, положительно реагирующих на маллеин и не имеющих подозрительных на сап клинических признаков (третья группа)

17. Всех лошадей 3-й группы, т. е. не имеющих подозрительных признаков заболевания сапом, но дающих положительную или сомнительную реакцию глазной маллеинизации, также переводят в сапизолятор, ставят отдельной группой и на 5-6-й день повторно подвергают глазной маллеинизации.

В зависимости от результата маллеинизации далее с лошадьми поступают так же, как и при исследовании лошадей 2-й группы.

Примечания: Жеребят-сосунов от кобыл 2-й и 3-й групп переводят в группу маллеинщиков или уничтожают вместе с их матерями.

18. Взятие проб крови для исследования на сап по РСК производит ветеринарный врач или ветфельдшер (с разрешения первого). Для исследования набирают приблизительно 10 мл крови. Взятие крови следует производить утром, перед кормлением лошадей. При взятии крови нужно следить за тем, чтобы кровь текла в пробирку струей, по стенке. Кровь, взятая каплями, вспененная, гемолизируется и часто дает неправильные результаты.

Летом пробирки с кровью для лучшего отстаивания сыворотки ставят в прохладное темное место, а зимой – около печи (30-37°) на 1 час и после этого выносят в прохладное место.

Кровь (сыворотку) направляют в лабораторию с нарочным в день взятия крови и во всяком случае не позднее 24 часов после ее взятия. На пробирках должны быть указаны клички или номера бирок лошадей. Упаковывать пробирки необходимо в отвесном положении, в таком же виде держать их во время перевозки. Зимой необходимо предохранять пробы крови от замерзания.

19. Всех лошадей, признанных маллеинщиками, таврят на шее справа буквой "М" (маллеинщик) и в обязательном порядке переводят в специальную организацию – пункт концентрации лошадей-маллеинщиков (далее – ПКМ).

Примечание. При нецелесообразности перевода лошадей-маллеинщиков в ПКМ последних уничтожают каждый раз с разрешения Главного государственного ветеринарного органа Приднестровской Молдавской Республики, государственной ветеринарной службы района (города).

8. Мероприятия в отношении подозреваемых в заражении сапом лошадей (четвертая группа)

20. Всех подозреваемых в заражении сапом лошадей (четвертая группа) неблагополучной по сапу организации (или части ее), помимо клинического осмотра, подвергают испытанию глазной маллеинизацией через каждые 15 дней впредь до объявления организации благополучным по сапу.

21. Выпас подозреваемых в заражении сапом лошадей допускают только в пределах территории данной организации на обособленном участке.

22. Естественную случку подозреваемых в заражении кобыл допускают только с жеребцами аналогичной группы или подвергают искусственному осеменению спермой здорового жеребца, полученной на здоровой кобыле в благополучной части организации.

9. Изолятор

23. В каждой неблагополучной по сапу организации оборудуют изолятор с отдельными денниками, в котором содержат только лошадей, положительно и сомнительно реагирующих на маллеин, в период дополнительного исследования. Денники должны быть отгорожены плотными перегородками, исключаями всякую возможность соприкосновения между собой находящихся в изоляторе лошадей.

Изолятор устраивают не ближе 200 м от конюшни, мест водопоя и выпаса лошадей. Лошадей переводят в изолятор с закрепленными за ними ведрами, скребницами, щетками, недоузками и помещают каждую в отдельном деннике.

Помещения изолятора и все предметы ухода за изолированными лошадьми подвергают дезинфекции один раз в 5 дней.

Проходы изолятора и помещения для обслуживающего персонала дезинфицируют ежедневно. Навоз сжигают.

При освобождении лошади из изолятора:

а) обязательно производят чистку кожного покрова, расчистку и дезинфекцию копыт;

б) все предметы ухода (ведра, щетки, скребницы, недоуздки и пр.) подвергают дезинфекции.

24. Для ухода за находящимися в изоляторе лошадьми назначают специально проинструктированных конюхов, которые работают под постоянным наблюдением ветперсонала.

Конюхи должны быть обеспечены спецодеждой, халатами, сапогами, галошами, перчатками. Указанную спецодежду необходимо регулярно подвергать дезинфекции, а халаты, кроме того, – стирке. Никто, кроме ветперсонала и лиц, назначенных для ухода за изолированными лошадьми, в изолятор не допускается.

Лица, назначенные для ухода за находящимися в изоляторе лошадьми, должны пройти предварительный медицинский осмотр.

Последующие их медосмотры их производят согласно указаниям медперсонала.

Примечания:

а) Лица, имеющие поражения и ссадины на руках и других открытых местах тела, не должны допускаться к работе с больными лошадьми впредь до излечения. других открытых местах тела, не должны допускаться к работе с больными лошадьми впредь до излечения.

б) В изоляторе необходимо постоянно иметь в наличии растворы дезинфицирующих средств, умывальник, мыло и полотенце.

25. Вынос спецодежды из изолятора для стирки и ремонта допускается только после предварительной ее дезинфекции.

Лица, занятые на работе в изоляторе, по окончании работы должны подвергать дезинфекции перчатки, сапоги и галоши и оставлять их вместе с халатом в изоляторе.

Употребление пищи и курение в изоляторе воспрещается.

10. Дезинфекция

26. Помещения, денники, стойла и пр., где находились больные сапом лошади, подлежат увлажнению дезинфицирующими растворами, и после механической очистки-дезинфекции (после каждого выделения сапной лошади).

Навоз, подстилку и остатки кормов из станков, откуда были выведены сапные лошади, немедленно после дезинфекции вывозят и сжигают.

Полы, после чистки, стены, столбы, перегородки и двери дезинфицируют 20%-ной взвесью свежегашеной извести или раствором хлорной извести, содержащим не менее 3% активного хлора, или горячим 4%-ным раствором едкого натра, или 5%-ным дезинфекционным креолином, или другими средствами согласно действующим наставлениям.

Все помещения после дезинфекции подвергают побелке раствором извести.

27. Все находящиеся в помещении предметы ухода за лошадьми, сбрую ведра и др. дезинфицируют:

а) металлические грабли, лопаты, цепи и другие предметы – путем

обжигания или дезинфицируют дезсредствами. Деревянные предметы, а также телеги, сани тщательно моют зольным щелоком и затем дезинфицируют так же, кожаные части сбруи и кожаную обувь тщательно протирают сулемово-карболовым раствором (1 л раствора сулемы I: 1000, 3%-ной карболовой кислоты) и после просушивания смазывают дегтем или жиром;

б) халаты, полотенца и т. п. обеззараживают кипячением в течение 30 минут, резиновую обувь вымачивают в 3%-ном растворе лизола или фенола или в 2%-ном растворе формальдегида в течение 2 часов, а затем ополаскивают, чистой водой;

в) малоценные предметы сжигают.

11. Снятие карантина

28. Карантин снимается через 45 дней со дня последнего случая выделения лошадей, признанных по клиническим признакам или диагностическим данным больными сапом, при условии получения трехкратных отрицательных результатов исследования всего конского поголовья глазной маллеинизацией (см. пункт 20 настоящей инструкции) и после проведения заключительной дезинфекции.