

El concepto de intervalo de confianza es muy utilizado en la etapa del análisis.

Por ejemplo, en la comparación de medias el intervalo de confianza es una gran herramienta fácil y efectiva.

O los coeficientes de la regresión lineal que calculaste en el pre training también pueden acompañarse con sus intervalos de confianza. (lo verás más adelante)

En esta hoja de trabajo vas a calcular los intervalos de confianza de las variables de la tabla de datos “espalda”.

Y de esta manera te vas a introducir en la comparación de medias.

¡Empezamos!

Abre la tabla de datos “espalda”

Abre la tabla de datos “espalda.xlsx” y crea una nueva variable llamada diff_ODI. Calcula esta variable de esta forma:

- $\text{diff_ODI} = \text{ODI_mes0} - \text{ODI_mes1}$

Esta variable será reflejo de la mejora de los pacientes.

Recuerda que ODI es sinónimo de “lo mal” que está el paciente por el dolor de espalda. Y con diff_ODI calculamos la mejora de este paciente.

Filtrando la variable por la variable “grupo”

Ahora se trata de utilizar los filtros de Excel para que consigas la variable diff_ODI por grupos de tratamiento.

Recuerda que la variable “Grupo” tiene dos posibles números:

- 0 = Tratamiento convencional
- 1 = Tratamiento innovador / avanzado

Puedes copiar la variable diff_ODI en dos columnas reflejando la información de cada tratamiento.


El encabezado te quedaría así:

diff_ODI Tratamiento convencional	diff_ODI Tratamiento avanzado
--------------------------------------	----------------------------------

Describiendo la variable diff_ODI

Crea un boxplot o un histograma para visualizar las dos distribuciones y comparar los dos tratamientos gráficamente.

Copia el boxplot de los dos grupos o los dos histogramas. El que prefieras ☺



La respuesta de los pacientes con el tratamiento avanzado es superior al convencional.

Calcula los intervalos de confianza

Después de la preparación que hemos hecho es momento de calcular los intervalos de confianza de la media al 95% y al 99%.

Rellena esta tabla para lograrlo.

"Grupo" Tratamientos	Media o Promedio	Desviación estándar	n: número de pacientes	Error Estándar EE	IC 95%		IC 99%	
					Inferior	Superior	Inferior	Superior
Tratamiento convencional	12.3366	5.4300	101	0.5403	11.2776	13.3956	11.0777	13.5956
Tratamiento avanzado	36.9687	8.7150	99	0.8759	35.2519	38.6854	34.9279	39.0095

DESCUBRIENDO LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

Recuerda que para calcular los intervalos de confianza tienes las siguientes pistas:

$$EE = \frac{\text{Desv. Estándar}}{\sqrt{n}}$$

$$IC\ 95\% = \text{Media} \pm 1.96 \cdot EE$$

$$IC\ 99\% = \text{Media} \pm 2.33 \cdot EE$$


Ahora que ves los resultados de los intervalos de confianza. ¿Qué puedes decir de los tratamientos?

Pista: si los intervalos no se solapan entre tratamientos quiere decir que hay diferencias significativas al 95% o al 99% dependiendo de cuál mires.

Si te ves con fuerzas dibuja los IC con un diagrama (googlea: gráfico intervalos de confianza). Te ayudará a verlo gráficamente.

Los resultados del tratamiento avanzado muestran mejora notoria en los pacientes incluso los resultados mas bajos de este tratamiento están por encima de la mayor parte de los resultados del tratamiento convencional.

diff_ODI Convensional vs Avanzado



Sin darte cuenta acabas de aprender dos aspectos:

- El cálculo de los intervalos de confianza

DESCUBRIENDO LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

- La comparación de medias con la ayuda de los IC

No ha sido tan difícil, ¿verdad?

Con esta estrategia estás preparado para presentar resultados estadísticamente relevantes cuando quieras comparar variables cuantitativas por grupos.

¡Sigue avanzando!