

□ Pall Leastion	Dhaniy Lantin	□ DCIII coetion
■ Bell Location	Phoenix Location	PCH Location
4901 W. Bell Rd.	7777 N 43rd ave	1701 E. Thomas Rd
Suite 100	Phoenix, AZ 85051	Suite 204
Glendale, AZ 85308	(602) 888-7844	Phoenix, AZ 85016
(602) 843-1275	, ,	(602) 253-6600

Instrucciones Postoperatorias para la sedación oral de su hijo

Sique:

Para facilitar el tratamiento dental, a su hijo se le ha administrado un medicamento sedante
☐ Meperidina (Demerol) e Hidroxizina (Vistaril)
☐ Midazolam (Versed) e Hidroxizina (Vistaril)
Hay algunas consideraciones y precauciones postoperatorias que debe tener en cuenta. son como

- **1.** Su hijo/a estará leve o moderadamente sedado durante la mayor parte del día. El medicamento puede permanecer en su cuerpo hasta por 24 horas. La mayoría de los niños están somnolientos y tranquilos después del tratamiento, aunque algunos pueden estar muy agitados. Incluso si su hijo parece estar bien, el medicamento puede afectar su capacidad motora y puede caerse abajo y lastimarse a sí mismos. Por lo tanto, recomendamos actividades tranquilas como ver películas, hablar con los padres, dormir o
- 2. Si su hijo/a está especialmente cansado cuando sale de la oficina, es importante que lo vigile mientras está en el automóvil con usted. Asegúrese de ser visual para su hijo durante el viaje a casa, no deje caer la cabeza hacia el pecho, lo que puede afectar su respiración.

descansar, etc. Debe permanecer con su hijo hasta que esté alerta y responda nuevamente.

- **3.** Es probable que a su hijo/a le hayan administrado anestesia local para que no sienta ninguna molestia durante su tratamiento dental. Esto significa que todos o parte de sus labios, mejillas y/o lengua están "adormecidos". El efecto de la anestesia generalmente desaparece en una o dos horas. La mayoría de los niños no saben qué es el "adormecimiento", por lo que es importante que vigile a su hijo de cerca para evitar que se muerda o se rasque la cara, los labios o la lengua mientras está "adormecido".
- **4.** Su hijo/a ha estado sin líquidos por un tiempo prolongado. Esto era importante para asegurar el mejor resultado del medicamento y para reducir la posibilidad de náuseas. Sin embargo, ahora es muy importante que tenga a su hijo/a beber líquidos claros lo antes posible. Los sorbos frecuentes de agua son los mejores. Zumos de frutas o deportivos. Las bebidas como "Gatorade" también son buenas. Los niños que no se hidratan bebiendo líquidos pueden tener fiebre y sentirse mal más tarde. Si se deshidratan, el riesgo de náuseas también aumenta.
- **5**. Su hijo debe comer solo alimentos blandos (sopa, pasta blanda, huevos revueltos, etc.) hasta la noche. Debido a la sedación, es posible que su hijo no mastique eficazmente y podría ahogarse con alimentos que no son blandos y requieren masticación. Su hijo debe comer normalmente por la noche y ciertamente mañana (dependiendo de sobre lo que se completó hoy).
- **6.** Su hijo debe experimentar muy poca o ninguna molestia debido al tratamiento dental. Sin embargo Dependiendo del tipo de tratamiento, es posible que desee darle a su hijo algo de tratamiento para niños. Tylenol. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones en el paquete con respecto a la dosis.
- 7. Es esencial que ayude a su hijo a mantener sus dientes limpios. Al hacerlo, ayudará a mantener el restauraciones (empastes, coronas, etc.) colocadas hoy y con suerte evitará o al menos controlará el futuro Cavidades. Asegúrese de usar hilo dental y un cepillo de dientes para limpiar los dientes de su hijo.
- **8.** Si su hijo ha tenido empastes de plástico o coronas de resina en los dientes, es posible que desee cepillarse los dientes con una solución diluida de peróxido de hidrógeno mezclado 1:1 con agua o un enjuague bucal de peróxido de hidrógeno disponible en farmacias (por ejemplo, Peroxyl). Esto ayudará a mantener el plástico lo más limpio y blanco posible.