

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 04 по 10 липня 2025 року.

Кукурудза – викидання волоті. Соняшник – утворення суцвіть, початок цвітіння. Соя – бутонізація. Картопля – цвітіння, кінець цвітіння. Сад – ріст плодів.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 11 % рослин на 87 % обстежених площ, личинками шкідника за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 30 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 10 % рослин на 87 % обстеженої площі. Гельмінтоспоріозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 30 % обстеженої площі, летючою сажкою уражено 1 % рослин (стеблова форма) на 30 % обстеженої площі (410 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносиками в середній чисельності 10 екз. на 100 п.с. та люцерновим клопом в середній чисельності бекз на 100 п.с. на 100 % обстежених площ. Аскохитозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 100 % обстеженої площі (68 га).

В посівах соняшнику гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 49 % обстежених площ, буряковою попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 76 % обстеженої площі. Пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 50 % обстеженої площі, септоріозом уражено 20 % рослин з розвитком хвороби 14 % на 13 % обстеженої площі, фомозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 27 % обстеженої площі, іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 50 % обстеженої площі (942 га).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину пошкоджено 25 % рослин, гусеницями капустяною міллю в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину пошкоджено 1 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 70 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину пошкоджено 35 % рослин.

Личинками колорадського жука в середній чисельності 3 шт. на кущ в середньому заселено 1 % кущів. Фітофторозом уражено 6 % кущів картоплі з розвитком хвороби 4 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 4 % рослин томатів з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

В плодових садах яблуневою попелицею в середній чисельності 3 екз. на

лист пошкоджено 2 % листків в середньому на 30 % дерев, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 3 % плодів в середньому на 40 % дерев на 100 % площ. Парша уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 30 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено 2 % плодів падалиці під 30 % дерев на 100 % обстеженої площі (4 га).