

Рецензия на применение препарата «СЕПТИСОЛ» у больных с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей нижних конечностей



Препарат «СЕПТИСОЛ» в аннотации представлен, как антисептическое и противовоспалительное средство с широким спектром действия. Учитывая значительную частоту воспалительных заболеваний нижних конечностей у пациентов с лимфовенозной недостаточностью, было проведено лечение препаратом «СЕПТИСОЛ» в виде местного воздействия на кожные покровы в области воспаления подкожной клетчатки и трофических язв нижней трети голени. Сравнительный анализ проводился на больных с острыми тромбофлебитами подкожных вен нижней конечности, венозными трофическими язвами голени, целлюлитом как микробного, так и микотического генеза.

Методика применения. На фоне стандартной общепринятой терапии пациенты получали компрессы местно на область воспаления в разведении 1:5 дважды в сутки длительностью на 4-6 часов. Трофические язвы орошались раствором препарата в разведении 1:5 в виде аэрозоля 3-5 раз в сутки в комбинациях с мазевыми повязками.

В результате проводимого лечения отмечено более быстрое купирование воспалительного процесса в среднем на 5 суток. Это подтверждалось уменьшением отека в дистальной части голени в среднем на 0,5 см в сравнении с контрольной группой, уменьшением гиперемии, локальной болезненности. Нормализация температурных показателей отмечено на 2 суток быстрее в основной группе наблюдения. Оценка самочувствия пациентов проводилась по визуальной аналоговой шкале и показала что «хороший» уровень здоровья достигнут на 10 сутки у 70% пациентов с использованием препарата и у 50% с традиционной терапией.

У больных с трофическими язвами при применении препарата «СЕПТИСОЛ» отмечено уменьшение кантаминации микрофлоры в мазках-отпечатках на 5 сутки на 70%, в то время как в контрольной группе только на 30%. Это способствовало переходу трофической язвы в стадию грануляции быстрее на 6 суток.

Анализ полученных данных свидетельствует о достаточно высокой антимикробной, анимикотической и противовоспалительной активности препарата «СЕПТИСОЛ» у больных с воспалительными процессами мягких тканей нижних конечностей, которые обусловлены микробными поражениями на фоне хронической лимфовенозной недостаточности.

Данный препарат целесообразен к применению в комплексном лечении при патологических состояниях, сопровождающихся местной воспалительной реакцией и бактериальным осеменением — трофические язвы, ушибы мягких тканей, гематомы, длительно незаживающие раны, подкожные тромбофлебиты.

Заведующий отделением сосудистой
хирургии МУЗГКБ № 12
доктор медицинских наук
«Городская клиническая
Больница № 12»
630084, г.Новосибирск - 84,
ул. Трикотажная, 49/1
тел. 271-16-00
«14» июня 2007 г.



Егоров В.А.