BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Ceftazidim**

I. Phổ kháng khuẩn

- Vi khuẩn gram âm, hiếu khí: *Haemophilus influenza, Proteus mirabilis, Moraxella catarrhalis* (gồm cả *Pseudomonas aeruginosa*)
- Vi khuẩn gram dương, hiếu khí: *Streptococcus spp. (S. agalactiae, S. pyogenes)*

II. Liều dùng: liều thường dùng 1 – 2 g IV/IM cách 8 – 12 giờ

III. Cách dùng

- Ceftazidim dùng tiêm bắp sâu, tiêm tĩnh mạch chậm trong 3 – 5 phút hoặc truyền tĩnh mạch trên 30 phút
- Chỉ sử dụng tiêm bắp khi không thể tiêm tĩnh mạch
- Chỉ sử dụng truyền tĩnh mạch đối với liều ceftazidim > 1 g
- ***Pha dung dịch tiêm bắp***: pha trong nước cất pha tiêm hoặc dung dịch lidocain hydrochlorid 0,5% hay 1%, có nồng độ 260 mg/mL
- ***Pha dung dịch tiêm tĩnh mạch chậm***: pha trong nước cất pha tiêm, dung dịch natri clorid 0,9% hoặc dextrose 5%, có nồng độ khoảng 100 mg/mL
- ***Dung dịch tiêm truyền***: pha trong nước cất pha tiêm, dung dịch natri clorid 0,9% hoặc dextrose 5%, có nồng độ khoảng 10 - 20 mg/mL

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- ***Phụ nữ mang thai***: nghiên cứu trên động vật không ghi nhận độc trên thai nhi. Sử dụng thuốc cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ.
- ***Phụ nữ cho con bú***: qua sữa mẹ với lượng nhỏ. Tuy nhiên, ở liều điều trị không ảnh hưởng đến việc bú mẹ của trẻ nên có thể sử dụng cho người đang cho con bú.

V. Lưu ý:

- Không pha chung với các kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc metronidazol
- Chống chỉ định với người có tiền sử sốc phản vệ với penicillin, cephalosporin

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Ceftazidime 1g
- Sefonramid 1g

Tài liệu tham khảo

1) *Dược thư Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation 2017*
3) *Sanford Guide 2023*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Trương Văn Hoà **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**