BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Colistin**

I. Phổ kháng khuẩn:

- **Vi khuẩn Gram âm**: *Acinetobacter, Citrobacter, E.coli, Enterobacter, Haemophilus influenza, Klebsiella penumoniae, Pseudomonas aeruginosa*
- ***Vi khuẩn đề kháng tự nhiên với colistin***: Vi khuẩn Gram dương, cầu khuẩn Gram âm*, Proteus, Providencia, Mycobacteria* và vi khuẩn kỵ khí.

II. Liều dùng:

- Liều thông thường: 2 MIU/lần x 3 lần/ngày
- Liều tối đa: 12 MIU/ngày chia làm 2 -3 lần (1)

III. Cách dùng:

- ***Đường dùng:*** Truyền tĩnh mạch
- ***Cách pha truyền tĩnh mạch:*** Hoàn nguyên 1 lọ colistin 1MIU với 5 ml dung dịch NaCl 0.9%, sau đó pha loãng với tối thiểu 100 ml dung dịch NaCl 0.9% (đối với liều ≥ 4MIU), hoặc 50 ml dung dịch NaCl 0.9% (đối với liều < 4 MIU)
- Truyền tĩnh mạch trong tối thiểu 30 phút

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- ***Phụ nữ mang thai:*** Dữ liệu trên người hạn chế - dữ liệu trên động vật có nguy cơ trung bình
- ***Phụ nữ cho con bú:*** Dữ liệu trên người hạn chế - có khả năng tương thích

V. Lưu ý:

- Chỉ sử dụng Colistin trong trường hợp vi khuẩn đa đề kháng.
- Colistin là kháng sinh thuộc Danh mục kháng sinh cần ưu tiên quản lí, khi kê đơn cần hội chẩn với dược sĩ lâm sàng và tuân thủ quy trình phê duyệt và quản lý kháng sinh.

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Colistin TZF 1MUI
- Colirex 1MIU

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022*
2) *AHFS 2023*
3) *Drugs in Pregnancy and Lactation 12th Edition 2022*

Tổ TTT-Dược lâm sàng	**Khoa Dược**
Ds. Bùi Kim Hoàng	**Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**