

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 13 по 20 березня 2025 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, багаторічні трави – відновлення вегетації.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 10 % обстежених площ, борошнистою росою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 26 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 17 % обстежених площ (1453 га).

В посівах озимого ячменю гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 37 % обстежених площ (135 га).

В посівах озимого ріпаку альтернаріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 7 % обстежених площ (683 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,3, нір на колонію – 4 на 37 % від обстежених площ 1453 га. На обстежених площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 7 на 29 % від обстеженої площі 135 га. На обстежених площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 3 на 37 % від обстеженої площі 683 га. На неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 6 на 50 % від обстеженої площі 4 га. На площах озимого гороху мишоподібних гризунів не виявлено.

Комірні шкідники. При обстеженні 0,13 тис. тонн соняшнику шкідників не виявлено.