

Подготовка к КТ исследованию

На исследование принести результаты: данные УЗИ, предыдущих КТ или МРТ, медицинские документы, выписки из стационаров (любой документ, который позволит обосновать необходимость выполнения Вам рентгеновского исследования)

При назначении исследования КТ с внутривенным контрастированием у пациента должны быть результаты биохимического анализа крови – мочевины ($\text{N}2,5-8,3$ ммоль/л) и креатинина ($\text{N}50-115$ мкмоль/л). При повышенных показателях исследование с контрастным веществом не проводится!

КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через неделю после.

Подготовка к КТ исследованию:

При нативном (бесконтрастном) КТ-исследовании специальной подготовки не требуется.

КТ органов брюшной полости

Исследование проводится натощак (спустя как минимум 3 часа после еды), допускается легкое питье.

Допустимо: чай, вода, если назначены лекарства, то можно принимать.

КТ при заболеваниях поджелудочной железы

Исследование проводится натощак (спустя как минимум 5-6 часов после еды).

Пероральный прием 0,5 л воды непосредственно перед началом исследования.

КТ почек, надпочечников и мочевыводящих путей

Исследование проводится натощак (спустя как минимум 3 часа после еды).

В течение 1 часа перед исследованием необходимо принять внутрь около 1 л воды без газа. Наполненный мочевой пузырь — не мочиться за 30 минут до назначенного времени.