

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 01 по 07 листопада 2024 року.

Озима пшениця – сходи, кущення. Озимий ріпак – сходи, утворення листової розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці личинками хлібної жужелиці в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 11 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,3 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 11 % обстеженої площі, яйцекладками злакової попелиці в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено 1 % рослин на 6 % обстежених площ. Відмічається літ злакових мух: гессенської мухи – 1 екз. на 100 п.с., шведських мух – 4 екз. на 100 п.с., цикадок в середньому нараховується 2 екз. на 100 п.с. на 4-9 % обстежених площ (1683 га).

У посівах озимого ріпаку капустяною попелицею за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 33 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 33 % обстежених площ (255 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 2 на 37 % обстеженої площі 1683 га. На площах озимого гороху (200 га) та озимого ріпаку (255 га) мишоподібних гризунів не виявлено.