

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 31 жовтня по 06 листопада 2025 року.

Озимий ріпак – сходи, 2 листочки. Озима пшениця – сходи, кущення.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 35 % обстежених площ, личинками хлібної жулички за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 35 % обстежених площ, личинками шведської мухи за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,2 % рослин на 35 % обстежених площ, яйцекладками злакової попелиці в середній чисельності 2 яйця на рослину в середньому заселено 1 % рослин на 13 % обстежених площ (764 га).

У посівах озимого ячменю гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (102 га).

У посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених площ, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ (60 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 57 % обстеженої площі 764 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 60 га. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 3, нір на колонію – 2 на 100 % обстеженої площі 114 га. На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 1 га. На площі кукурудзи (122 га) мишоподібних гризунів не виявлено.