

V blíží se podzimní a zimní sezóně respiračních infekcí lze právem očekávat stejně jako v minulém roce vedle chřipky a ostatních respiračních infekcí, také zvýšení výskytu onemocnění COVID-19. Z toho důvodu se doporučuje selektivní přeočkování rizikových dětských pacientů proti této nákaze. Doporučení Odboru ochrany veřejného zdraví MZČR uvádí výčet rizikových skupin bez rozdělení na dětskou a dospělou populaci, ale přesto je vcelku výstižný.

Doporučuje se přeočkování dětem s -

- a) imunodeficitem vrozeným či získaným, včetně stavů s imunosupresivní terapií (dlouhodobá kortikoterapie, stavy po transplantaci, revmatická onemocnění, IBD, biologická léčba, aj.)
- b) dekompenzovaným nebo subkompenzovaným onemocněním plic a dýchacích cest
- c) chronickým subkompenzovaným onemocněním jater či ledvin (zejména hemodialyzované děti)
- d) závažným subkompenzovaným onemocněním srdce (zejména stavy po operaci srdce)
- e) těžkou obezitou s BMI či poměrem hmotnost-výška nad 3,5 SDS pro daný věk
- f) neurologická onemocnění snižující svalovou sílu nebo zvyšující riziko aspirace

Doporučení Odboru ochrany veřejného zdraví MZČR také doporučuje přeočkování diabetiků, ale konsenzus s dětskými diabetology pro dětský věk není očkování nakloněn, proto je vhodné očkování doporučit jen pokud ho výslovně doporučí dětský diabetolog.

Všechna očkování rizikových dětí je vhodné provádět po konzultaci s dispenzarizujícím specialistou.

Dále upozorňujeme na doporučení k přeočkování všech zdravotnických pracovníků.