

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 11 по 17 липня 2025 року.

Кукурудза – викидання волоті. Соняшник – утворення суцвіть, початок цвітіння. Соя – початок цвітіння. Картопля – в'янення бадилля. Сад – ріст плодів.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 17 % рослин на 67 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 23 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 21 % рослин на 87 % обстеженої площі, яйцекладками стеблового метелика за середньої чисельності 1 яйцекладка на рослину в середньому заселено 4 % рослин на 27 % обстежених площ (958 га).

У посівах сої бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 6 екз. на 100 п.с. та люцерновим клопом у середній чисельності 9 екз на 100 п.с. на 64 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 27 % обстеженої площі (109 га).

У посівах соняшнику гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 17 % обстежених площ, геліхризовою попелицею в середній чисельності 11 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 58 % обстеженої площі, яйцекладкою бавовникової совки за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено 1 % рослин на 25 % обстежених площ, яйцекладками соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено 4 % рослин на 11 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 2 % рослин із розвитком хвороби 1 % на 50 % обстеженої площі, септоріозом уражено 17 % рослин із розвитком хвороби 12 % на 8 % обстеженої площі, фомозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 51 % обстеженої площі, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма - 45 %, стеблова форма - 55 %) на 21 % обстежених площ (942 га).

На присадибних ділянках у середній капусті капустиною попелицею в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 35 % рослин, гусеницями капустиної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 2 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3,5 екз. на заселену рослину пошкоджено 55 % рослин.

Личинками колорадського жука в середній чисельності 2 шт. на кущ в середньому заселено 3 % кущів. Фітофторозом уражено 7 % кущів картоплі з розвитком хвороби 5 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 5 % рослин томатів з розвитком хвороби 3 % (присадибні ділянки).

У плодових садах паршею уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 40 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено 4 % плодів падалиці під 50 % дерев на 100 % обстеженої

площі (4 га).

З метою моніторингу фітосанітарного стану озимої пшениці спеціалістами управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області було локально проведено обстеження 5155,26 га посівів озимої пшениці з відбором зразків колоса на визначення мікологічних хвороб. Зразки для проведення аналізів надсилались до Державної установи «Кіровоградська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби».

За результатами фітосанітарної експертизи виявлено такі хвороби: *Alternaria alternata* (Fr) Keissl (альтернаріоз) майже на всій площі, *Ascochyta graminicola* Sass. (аскохітоз) на 92 % обстеженої площі, *Rhizoctonia spp.* (іржа) на 60 % обстеженої площі, *Ustilago tritici* (Pers) Jens. (летюча сажка) на 4 % обстеженої площі, *Drechslera teres* f. *sp. maculata* (сітчаста плямистість ячменю) на 5 % обстеженої площі, *Fusarium graminearum* Schw (фузаріоз злакових) на 1% обстеженої площі та *Erysiphe graminis* DC (борошниста роса) на 1% обстеженої площі.