

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 07 квітня 2022 року.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки заселено 7 % від обстеженої площі 1153 га, в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1 % рослин в сильному ступені, гусениці VI віку.

Личинками хлібної жужелиці (туруна) заселено 7 % від обстеженої площі озимої пшениці 1153 га, в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин, в т.ч. в слабкому ступені – 40, середньому – 50, сильному – 10 %. Личинки II віку. За чисельності 3-4 і більше личинок жужелиці на кв.м посіви під час весняного кущення вибірково обприскують рекомендованими препаратами згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, підготовленого за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2022 році, (далі – Перелік).

Злаковими цикадами в середній чисельності – 6, максимально – 9 екз. на 100 п.с. пошкоджено 1 % рослин в слабкому ступені на 30 % від обстеженої площі озимої пшениці 1153 га.

З 24 березня відмічено вихід піщаного мідляка, шкідником в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин озимої пшениці в слабкому ступені на 7 % від обстежених площі озимої пшениці 1153 га. З появою сходів ярого ячменю, соняшнику, кукурудзи, інших просапних культур фітофаг заселятиме та шкодитиме в цих посівах. Дотримання комплексу основних агротехнічних та хімічних заходів, передусім сівозміни, передпосівної обробки насіння, оптимальні строки сівби надійно захистять посіви від шкідника.

Борошнистою россою в середньому уражено – 2, максимально – 3 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби 1 % на 254 га з 1153 га обстежених. Бурою іржею в середньому уражено – 2, максимально – 4 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 225 га з 1153 га обстежених. Септоріозом в середньому уражено – 3, максимально – 5 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 571 га з 1153 га обстежених.

Гельмінтоспоріозом уражено 1 % рослин озимого ячменю з розвитком хвороби 1 % на 63 га з 328 га обстежених.

На посівах, де дотримуються технології вирощування культур і своєчасно провели боронування, підживлення та оздоровлення рослин, не відмічається перезараження та поширення хвороб. Під час виходу рослин в трубку, за

інтенсивності ураження борошнистою росою, бурюю листковою іржею, гельмінтоспоріозом, іншими плямистостями 1 %, септоріозом листя 3-5 %, кореневими гнилями за достатнього зволоження – обприскують рекомендованими фунгіцидами відповідного спектру дії.

Імаго ріпакового стеблового прихованохоботника в середній чисельності 3 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 140 га з 739 га обстежених.

Хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 140 га з 739 га обстежених.

Альтернاریозом уражено 2 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 52 га з 739 га обстежених.

Стан посівів ріпаку покращують агротехнічними заходами (розпушування міжрядь, боронування, підживлення азотними добривами). За появи хвороб проводять оздоровлення фунгіцидами згідно Переліку. Осередки заселення хрестоцвітими блішками (ЕПШ 3-5 екз. на кв.м), листкоїдами (ЕПШ 3 екз. на кв.м), прихованохоботниками (ЕПШ 5-6 жуків на рослину) захищають через обробки рекомендованими інсектицидами.

В посівах озимої пшениці мишоподібними гризунами заселено 55 % від обстеженої площі 1153 га, середня чисельність колоній – 1,6, максимально – 3 на га, в середньому – 5, максимально – 9 нір на колонію. В посівах озимого ячменю шкідником заселено 36 % від обстеженої площі 328 га, середня чисельність колоній – 1 на га, в середньому – 5, максимально – 6 нір на колонію. В посівах озимого ріпаку шкідником заселено 33 % від обстеженої площі 374 га, середня чисельність колоній – 2, максимально – 3 на га, в середньому – 6, максимально – 8 нір на колонію. На неорних площах середня чисельність колоній – 1 на га, в середньому – 6, максимально – 8 на колонію на 14 % від обстежених площ 23,2 га. На обстежених площах з-під кукурудзи (50 га), з-під соняшнику (50 га) шкідника не було виявлено.

За економічного порогу шкодочинності (3-5 кол/га) мишоподібних гризунів необхідно продовжувати винищувальні та профілактичні заходи родентицидами згідно Переліку.