

Маркеры насилия

Маркеры сексуального насилия:

- не соответствующие возрасту знания в области сексуальных отношений;
- синяки, зуд, кровь в области половых органов;
- мастурбация;
- внезапные изменения в поведении ребенка;
- появление соблазняющей манеры поведения;
- отсутствие аппетита или переедание;
- расстройство сна, ночные кошмары;
- ненависть к своему телу;
- излишняя уступчивость по отношению к взрослым;
- глубокая депрессия с частыми суицидальными попытками или мыслями;
- нежелание идти домой, побеги из дома;
- склонность к правонарушениям, прогулы в школе;
- злоупотребление наркотиками и алкоголем;
- беспорядочные половые связи;
- венерические заболевания;
- трудности при ходьбе и сидении;
- нежелание передаваться при других детях;
- беременность и др.

Маркеры психологического насилия:

- низкая самооценка, ребенок чувствует себя нелюбимым, ненужным, никчемным;
- ребенок считает, что родители унижают, критикуют его, угрожают бросить;
- ребенок печален и расстроен;
- ожидает физического насилия;
- задержка речевого развития и восприятия;
- неумение мыслить логически, решить поставленную задачу, отыскать причину и следствие;
- неуважение и недоверие к взрослым;
- агрессия в отношениях со сверстниками;
- демонстрация псевдозрелости и псевдонезависимости как защиты;
- суицидальные попытки;
- неверие в искренность оказываемой ему поддержки;
- не может внутренне почувствовать успех, считает себя не заслужившим его и др.

Маркеры физического насилия:

- синяки и кровоподтеки на теле в различной степени заживания, нанесенные шнуром, ремнем, палкой и т. д.;
- необъяснимые следы ожогов, как правило, от сигарет на пятках, ладонях, спине и ягодицах;
- ожоги горячим предметом (от зажигалки, сковородки, утюга и т. д.);

- внутренние повреждения (разрыв печени, в результате удара в живот);
- переломы, вывихи или растяжения, главным образом черепа, носа, лица, в разных стадиях заживания;
- наличие на голове участков без волос;
- шрамы, следы связывания, следы ногтей, следы от сжатия пальцами;
- след от руки, следы укусов на коже;
- необычное состояние ребёнка после насильственного приема лекарств или алкоголя;
- ощущает тревогу в общении с взрослыми;
- испытывает чувство вины;
- проявляет крайние формы поведения; или агрессивность, или нежелание общаться;
- боится родителей;
- боится идти домой;
- жалуется, что родители бьют;
- часто смотрит в одну точку, ничего не видя вокруг;
- может долго лежать на одном месте, озираясь вокруг;
- не плачет при осмотре врача;
- путано отвечает на вопросы;
- болезненно реагирует на плач других;
- иногда ведет себя чрезмерно по-взрослому;
- пытается манипулировать другими, чтобы привлечь к себе внимание;
- имеет низкую самооценку;
- необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный ребёнок теперь постоянно грустен, задумчив, замкнут);
- побег из дома;
- ношение неподходящей к погодным условиям одежды (чтобы скрыть кровоподтеки).