



(510) 679-3300
27206 Calaroga Ave - Ste 201
Hayward, CA 94545
BalanceMedico.com

Sildenafil + Tadalafil + Apomorfina para la disfunción eréctil (DE) Educación para Pacientes

La disfunción eréctil (DE) afecta a millones de hombres y puede deberse a una combinación de factores físicos, hormonales y psicológicos. En Balance Médico, ofrecemos tratamientos avanzados y personalizados que abordan todos los aspectos de la función sexual. Una de nuestras terapias combinadas más efectivas incluye sildenafil, tadalafil y apomorfina, una fórmula exclusiva diseñada para mejorar la calidad de la erección, la excitación y la satisfacción sexual.

¿Qué es el sildenafil? Sildenafil (también conocido Viagra®) es un inhibidor de la PDE5 que mejora el flujo sanguíneo al pene al relajar los vasos sanguíneos. Ayuda a producir una erección firme en respuesta a la estimulación sexual.

- **Comienzo:** 30–60 minutos
- **Duración:** 4–6 horas
- **Objetivo:** Proporciona un soporte eréctil fuerte y rápido.

¿Qué es el tadalafil? Tadalafil (el ingrediente activo en Cialis®) es otro inhibidor de la PDE5 que funciona de manera similar al Sildenafil pero tiene una duración de acción más prolongada.

- **Inicio:** 30–45 minutos
- **Duración:** Hasta 36 horas ("la píldora del fin de semana")
- **Objetivo:** Mantiene un flujo sanguíneo mejorado durante un período más prolongado, lo que aumenta la disposición y la espontaneidad.

¿Qué es la apomorfina? La apomorfina es un agonista de los receptores de dopamina que actúa en el cerebro para aumentar el deseo y la excitación sexual. Favorece la respuesta sexual natural del cerebro y mejora la capacidad del cuerpo para responder a la estimulación sexual.

- **Inicio:** 10–20 minutos
- **Duración:** 1–2 horas
- **Objetivo:** Aumenta la libido y la respuesta sexual

¿Por qué combinar estos tres? La combinación de sildenafil, tadalafil y apomorfina ofrece un enfoque integral de triple acción para la disfunción eréctil:

1. **Mejora el flujo sanguíneo (Sildenafil + Tadalafil)**
2. **Aumenta la excitación y el deseo (Apomorfina + Tadalafil)**
3. **Favorece tanto la respuesta eréctil inmediata como la duración**

Esta mezcla es ideal para hombres que no han tenido éxito total con medicamentos individuales para la disfunción eréctil o que desean mejorar su rendimiento, confianza y espontaneidad.

Beneficios reportados

- **Erecciones más fuertes y duraderas**
- **Mayor excitación sexual, satisfacción sexual y deseo**
- **Inicio de acción más rápido que la medicación oral típica**
- **Mayor flexibilidad en cuanto al momento de la intimidad**

Posibles efectos secundarios: Como todo medicamento, pueden presentarse efectos secundarios. La mayoría son leves y transitorios. Los efectos secundarios comunes incluyen: enrojecimiento o sensación de calor en la cara, dolor de cabeza, mareo o aturdimiento, náuseas leves y congestión nasal.



(510) 679-3300
27206 Calaroga Ave - Ste 201
Hayward, CA 94545
BalanceMedico.com

- Raras: Presión arterial baja o desmayos (especialmente si se toma con nitratos o ciertos medicamentos para la presión arterial).

Si experimenta dolor en el pecho, mareos intensos, cambios en la visión o una erección prolongada (que dure más de 4 horas), busque atención médica de inmediato. Esta no es una lista completa de posibles efectos secundarios.

Cómo usar

- Tómelo según las indicaciones de su médico, generalmente de 15 a 45 minutos antes de la actividad sexual. Para obtener mejores resultados, tómelo con el estómago vacío.
- Deje que se disuelva debajo de la lengua; no la mastique ni la trague inmediatamente.
- No tome más de una dosis en un período de 24 horas.
- La estimulación sexual es necesaria para que el medicamento sea efectivo.
- No tome alcohol ni drogas recreativas - esto puede reducir su eficacia y causar efectos secundarios.

Cuándo llamar a su médico: Comuníquese con su proveedor de atención médica si:

- Experimentar efectos secundarios graves o reacciones alérgicas (sarpullido, picazón, hinchazón).
- Presentan efectos secundarios persistentes que interfieren con la vida diaria.

Precauciones y advertencias

1. **Alcohol:** Limite el consumo del alcohol; puede aumentar el riesgo de efectos secundarios.
2. **Conducción u operación de maquinaria:** La apomorfina puede causar somnolencia o mareo. Si experimenta estos efectos, evite actividades que requieran estar alerta.
3. **Condiciones preexistentes:** Informe a su médico si padece alguna afección cardíaca, presión arterial baja, enfermedad hepática o renal, trastornos de la retina o problemas de visión, o antecedentes de priapismo.
4. **Interacciones medicamentosas:**
 - No combinar con alfa-bloqueantes, nitratos (p. ej., nitroglicerina) u otros medicamentos que disminuyan la presión arterial.
 - Evite combinarlo con otros inhibidores de la PDE5 o medicamentos que afecten los niveles de dopamina sin consultar a un médico.

Atención de seguimiento: Las visitas de seguimiento permiten a su médico controlar sus resultados, ajustar la dosis y garantizar su seguridad. Los resultados pueden variar de un paciente a otro. La comunicación regular sobre cómo le está funcionando el medicamento ayuda a maximizar los resultados y minimizar los efectos secundarios. Balance Médico ofrece apoyo continuo para ajustar su dosis y maximizar los efectos, ayudarle a mantener los resultados y abordar cualquier factor subyacente que pueda contribuir a la disfunción eréctil, como niveles bajos de testosterona, problemas vasculares o ansiedad por el rendimiento.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente (20-25 °C o 68-77 °F). Mantener alejado de la humedad, el calor y la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Consejos adicionales para el éxito: Practica juegos previos para potenciar los efectos del medicamento. Mantén un estilo de vida saludable, que incluya ejercicio regular, una alimentación equilibrada y el manejo del estrés, para mejorar la función eréctil en general.

Es importante que continúe acudiendo a su médico de cabecera para sus revisiones, pruebas y controles de salud habituales. No estamos sustituyendo a su médico de cabecera.