

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 21 вересня 2023 року.

Хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 9 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 379 га з 416 га обстежених.

Несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 0,6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено - 6, максимально - 10 % рослин на 243 га озимого ріпаку з 416 га обстежених.

Гусеницями ріпакового білану в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 153 га озимого ріпаку з 416 га обстежених.

В Олександрійському районі (Петрівський район) гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 120 га озимого ріпаку.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 51 % від обстеженої площі 244 га.

Пухирчастою сажкою уражено 2 % рослин (на качанах - 30 %, на стеблі - 70 %) на 120 га кукурудзи з 244 га обстежених площ.

Летючою сажкою уражено 1 % рослин (на волоті 100 %) на 244 га кукурудзи.

В Кропивницькому районі (Долинський район) гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 5 екз. на кошик заселено і пошкоджено 3 % рослин соняшнику (112 га).

Фомозом в середньому уражено – 21, максимально – 25 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 16, максимально – 20 % на 20 % обстежених площ (1007 га).

Сірою гниллю уражено – 6, максимально - 10 % рослин соняшнику (284 га з 1007 га обстежених) в прикореневій формі – 43 %, стебловій формі – 17 %, кошиковій формі – 40 % з розвитком хвороби на кошиках 4 %.

Білою гниллю уражено – 3, максимально – 8 % рослин соняшнику (300 га) в прикореневій формі – 55 %, стебловій формі – 20 %, кошиковій формі – 25 % з розвитком хвороби на кошиках – 2 %, максимально – 5 %.

Фітофторозом в середньому уражено – 28 %, максимально – 30 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 24 %, максимально – 26 %.

В Кропивницькому районі (Бобринецький та Олександрівський райони) капустяною попелицею в середній чисельності – 9, максимально – 18 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 15, максимально - 20 %

рослин пізньої капусти в слабкому ступені 95 %, середньому – 5 % (присадибні ділянки); хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 2, максимально - 4 екз. на рослину заселено і пошкоджено – 20 %, максимально - 25 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки) в слабкому ступені – 96 %, середньому - 4 %. Слизистим бактеріозом уражено 1 % рослин пізньої капусти з середнім розвитком хвороби 1 %. Фомозом уражено 2 % рослин пізньої капусти з середнім розвитком хвороби 2 %.

В Кропивницькому районі (Олександрійський район) паршею яблуні в середньому уражено 12 % листків з середнім розвитком хвороби – 3 %, уражено 3 % плодів з розвитком хвороби – 2% на 20 % дерев (1 га), плодовою гниллю в середньому уражено 1 % плодів падалиці під 30 % дерев (1 га).

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1 на га, в середньому 2 нори на колонію на 30 га з 416 га обстежених. На площах з-під зернових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2 на га, в середньому 2 нір на колонію на 297 га з 379 га обстежених. На площах з-під соняшнику (55 га) середня чисельність колоній шкідника 2 на га, в середньому 6 нір на колонію. На площах багаторічних трав (7 га з 14 га обстежених) середня чисельність колоній шкідника 2 на га, в середньому 5 нір на колонію.

З метою запобігання збільшення чисельності та шкідливості мишоподібних гризунів слід проводити постійний моніторинг їх розвитку та профілактичні заходи щодо зменшення чисельності шкідників: глибока оранка полів, знищення гризунів у місцях резервацій з метою недопущення розселення їх у посіви озимих сільськогосподарських культур. За наявності 3-5 і більше жилих колоній на гектарі необхідно застосовувати родентициди, дозволені до використання Переліком. З метою охорони навколишнього середовища перевагу надавати біологічному методу боротьби.