

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 16 по 22 травня 2025 року.

Озима пшениця – утворення колоса. Озимий ячмінь –початок колосіння. Озимий ріпак – кінець цвітіння, поява стручків. Горох – початок цвітіння. Кукурудза, соняшник, соя –сходи. Цукрові буряки – сходи.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 20 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 36 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 28 % обстеженої площі, злаковими п'явицями за середньої чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 56 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 2 яйця на рослину на 1 % обстежених площ, личинками хлібної п'явиці за середньої чисельності 0,3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 15 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: гессенська муха – 13 екз на 100 п.с. на 7 % від обстежених площ, пшенична муха – 16 екз на 100 п.с. на 7 % від обстежених площ, шведські мухи – 6 екз. на 100 п.с на 13 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. на 7 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 55 % обстежених площ, бурюю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 23 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 69 % обстежених площ (1738 га).

В посівах озимого ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 32 % обстежених площ, злаковими п'явицями в середній чисельності 0,5 екз. на заселену рослину в середньому пошкоджено 1 % рослин на 23 % обстеженої площі. Гельмінтоспоріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 23 % обстежених площ (297 га).

В посівах озимого ріпаку личинками капустяного стеблового прихованохоботника за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 37 % обстежених площ, оленкою волохатою в середній чисельності 1,6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % квіток на 33 % обстежених площ, ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 7 % квіток на 36 % обстежених площ, ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в

середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % квіток на 11 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 28 % обстежених площ (235 га).

В посівах гороху на 100 п.с. нараховується: горохової попелиці – 1 екз, горохового зерноїда – 1 екз. Іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 51 % обстежених площ (182 га).

В посівах цукрових буряків буряковим довгоносом в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ (110 га).

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 45 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 62 % обстеженої площі (264 га).

В посівах соняшнику дротяниками в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 21 % обстежених площ, личинками коника зеленого в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 13 % обстежених площ, сірим довгоносом в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 18 % обстежених площ, піщаним мідляком в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 83 % обстежених площ (846 га).

В посівах сої дротяниками в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 100 % обстежених площ (140 га).

Обстежено 2 га багаторічних трав, на 100 п.с. нараховується: бульбочкові довгоносики 7 екз., люцерновий клоп 3 екз., люцерновий довгоносик 5 екз.

Колорадським жуком в середній чисельності 1,5 екз. на кущ заселено і пошкоджено 16 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % кущів (присадибні ділянки).

З 20 травня відмічено початок льоту яблуневої плодожерки.