


Задача 1

2-річна дитина, не вакцинована, звернулась за допомогою до сімейного лікаря в амбулаторію зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,9оС, сухий кашель, серозні виділення з носа, кон'юнктивіт і світлобоязнь, висип (фото 2). При об'єктивному обстеженні візуалізується плямисто-пульозний висип за вухами, на обличчі, боковій поверхні шиї, тулубі, зливного характеру, а також виявлені зміни на слизовій оболонці ротової порожнини, зображені на фото (див. фото).



1. Назвіть попередній діагноз.
2. Вкажіть який патогномонічний симптом зображений на фото? В які терміни даний симптом з'являється?
3. Які лабораторні методи діагностики використовують для верифікації діагнозу?
4. Тактика ведення та лікування.

Задача 2.

Батьки привели дівчинку 3-х років до сімейного лікаря з приводу висипу. Вона відвідує дитячий садок, де близько 2 тижнів тому у кількох інших дітей була подібна висипка та температура. У хворої вчора ввечері піднялася температура, а сьогодні вранці з'явилася свербляча висипка на голові та грудях. Під час фізичного огляду у неї є численні везикули на обличчі, грудях і спині, а також екскоріації від подряпин.



1. Попередній діагноз.
2. Опишіть особливості висипу при даному захворюванні.
3. Чи існує специфічна профілактика даного захворювання? Якщо так, то яка?
4. Тактика лікування та ведення пацієнтки. Терміни обмеження соціальних контактів пацієнтки.

Задача 3.

Дитина 4 років захворів 14 днів тому, коли з'явився кашель, який поступово наростав, набуваючи все більш завзятого нав'язливого характеру. З 11 дня кашель став приступоподібним із репризами, до 12-14 разів на добу. Тривалість нападу 1-2 хвилини. Під час кашлю обличчя хворого червоніє, іноді навіть синіє, шийні вени набухають. Приступ кашлю закінчується виділенням в'язкого мокротиння, іноді (1-2 рази на добу) блюванням. Стан дитини середньо - тяжкий. У міжприступний період зберігається одутлість обличчя, блідість шкірних покривів, періоральний ціаноз. Під час огляду на вуздечці язика виявлено виразку. Серцеві тони ритмічні, трохи приглушені. З боку інших органів та систем патології не виявлено. Дитина не вакцинована

1. Попередній діагноз.
2. З якими захворюваннями можливо провести диференційний діагноз.
3. Основні напрямки лікування.
4. Специфічна профілактика.